

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

女 性 薬  
ジツボンS

第3類医薬品

J I T S U B O N S

## 特 徴

ジツボンSは、11種類の生薬を配合した生薬製剤で、女性特有の諸症状に効果があるよう処方されています。特に生理時や更年期に重なって起こることの多い不快な諸症状(イライラ、冷え、のぼせ、むくみなど)にすぐれた効果をあらわします。小粒でのみやすい錠剤タイプです。



## 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  

| 関係部位  | 症 状       |
|-------|-----------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 吐き気、食欲不振  |
- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

更年期障害、血の道症、月経不順、冷え症及びそれらに随伴する次の諸症状：月経痛、腰痛、頭痛、のぼせ、肩こり、めまい、動悸、息切れ、手足のしびれ、こしけ、血色不良、便秘、むくみ

### 【血の道症とは…】

月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴ってあらわれる精神不安やいらだちなどの精神神経症状及び身体症状のことです。



太田胃散

裏面に続きます

## ■ 用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はぬるま湯で服用してください。

| 年齢        | 1回量                                                                                  | 1日服用回数 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 成人(15歳以上) | 4錠  | 3回     |
| 15歳未満     | 服用しないこと                                                                              |        |

※食前とは食事の30分ほど前、食間とは食後2～3時間のことをいいます。

## ■ 成分 1日量(12錠)中

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| (日局) トウキ末……………420mg   | (日局) センキュウ末……………420mg  |
| (日局) シャクヤク末……………300mg | (日局) ケイヒ末……………180mg    |
| (日局) オウゴン末……………96mg   | (日局) ソウジュツ末……………96mg   |
| (日局) チョウジ末……………96mg   | (日局) ブクリョウ末……………49.2mg |
| (日局) カンゾウ末……………34.8mg | (日局) オウレン末……………30mg    |
| (日局) チクセツニンジン末…18mg   |                        |

[添加物] 軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール6000、タルク

## ■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) キャップの裏に装着してある乾燥剤は、取り外さないようにしてください。  
また、乾燥剤を誤って服用しないでください。
- (5) ビンの中の詰め物は錠剤が輸送中に破損するのを防ぐものですので、開封後は捨ててください。
- (6) 湿気等の影響で品質が変わることがあるため、服用のつどキャップをしっかり閉めてください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (8) 水分の付着が変色や錠剤をコーティングしているフィルムのムラ等の原因となりますので、ぬれた手で錠剤に触れないでください。また、ぬれた手等で触れた錠剤はビンに戻さないでください。

## 姉妹品の紹介

ティーバッグ(茶剤)タイプの女性薬 きだにじつぽさん 喜谷實母散

### 製品のお問い合わせ先

株式会社 太田胃散「お客様相談室」  
☎ (03) 3944-1311 (代表)  
受付時間 9:30～17:00(土、日、祝日等を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



太田胃散HP

販売元

株式会社 太田胃散  
東京都文京区千石2-3-2  
<https://www.ohta-isan.co.jp/>

製造販売元

株式会社ウチダ和漢薬  
新潟県上越市大潟区蜘蛛池1755-3