

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痒消炎薬

第2類医薬品

かゆみ・虫さされに・・・

アレギール[®]クリーム

〈アレギールクリーム〉は、

- 虫さされなどのかゆみに、早く、優れた効果のあるかゆみ止めクリームです。
- 局所麻酔剤 塩酸リドカインをはじめ、消炎・鎮痒作用のある副腎皮質ホルモン剤 プレドニゾン酢酸エステル、抗ヒスタミン剤 クロルフェニラミンマレイン酸塩、殺菌剤 クロルヘキシジン塩酸塩などの成分を配合してあります。
- 虫さされのみならず、はげしいかゆみや炎症を伴う皮膚病に優れた治療効果が期待できます。
- バニシングタイプのクリームですから、塗布したあと、ベタつかず、皮膚によく浸透し、使用感もさわやかです。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないで下さい

- (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
- (2) 目の周囲、粘膜(例えば、口唇等)

2. 長期連用しないで下さい



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 患部が広範囲の人
- (5) 湿潤やただれのひどい人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

■ 効能・効果

- かゆみ、虫さされ、あせも、じんましん
- かぶれ、しもやけ、かみそりまけ
- 湿疹、皮膚炎、ただれ

■ 用法・用量

1日1～数回適量を患部に塗布して下さい

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 用法を厳守して下さい。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
3. 目に入らないよう注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
4. 外用にのみ使用して下さい。

■ 成 分

〈アレギールクリーム〉は、特異の芳香を有するほとんど白色の軟膏で、1g中に次の成分を含有しています。

成分	含量 (1g中)	作用
塩酸リドカイン	30 mg	かゆみ・痛みをすみやかに鎮めます
クロルフェニラミンマレイン酸塩	10 mg	かゆみを鎮めます
プレドニゾン酢酸エステル	1.25mg	かゆみ・炎症をやわらげます
クロルヘキシジン塩酸塩	2 mg	かき傷などの化膿を防ぎます
サリチル酸メチル	20 mg	熱をとり、痛みを鎮めます
l-メントール	5 mg	かゆみを鎮めます
d-カンフル	5 mg	痛み・かゆみを鎮めます

添加物：流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸、セタノール、グリセリン脂肪酸エステル、ステアリン酸ポリオキシル、パラベン、プロピレングリコール、エト酸Na

■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

電 話 03(6667)3232

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

Y03 登録商標



製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋小網町1-8