

スキネード射泡

殺菌消毒剤

本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。



使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 医師の治療を受けている人
 - 2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 3) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 4) 患部が広範囲の人
 - 5) 深い傷やひどいやけどの人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持つて医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
 - 2) 5~6日間使用しても症状が良くならない場合

効能・効果

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

用法・用量

1日数回、適量を患部に直接塗布又はガーゼ、脱脂綿等に泡状にのせ塗布する

(用法・用量に関連する注意)

- 1) 定められた用法・用量を厳守すること
- 2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- 3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科専門医の診療を受けること
- 4) 外用にのみ使用し、内服しないこと

成分・分量

本品 100mL 中

ジブカイン塩酸塩	100mg
ナファゾリン塩酸塩	100mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	200mg
ベンザルコニウム塩化物	100mg
添加物：エデト酸ナトリウム水和物、ラウリン酸ジエタノールアミド、エタノール	

保管及び取扱い上の注意

- 1) 小児の手のとどかない所に保管すること
- 2) 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- 3) 誤用を防ぎ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

【包装】 80mL



製造販売元
大洋製薬株式会社
 東京都文京区本郷 3-14-16

I08-FL

大洋製薬お客様相談窓口
 ☎ 0120-184328
 受付時間 午前10時~午後4時(土・日曜、祝日は除く)

副作用被害救済制度
 ☎ 0120-149-931