

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

ガストール細粒

第2類医薬品

胃腸薬 M1プロロッカー配合

- 胸やけは食べ過ぎなどにより胃酸が逆流することで引き起こされます。また、ストレス等により出過ぎた胃酸が胃を刺激すると胃痛が引き起こされます。
- ガストール細粒は速効性制酸剤(炭酸水素ナトリウム)と持続性制酸剤(メタケイ酸アルミン酸マグネシウム)が出過ぎる胃酸を効果的に中和し、M1プロロッカー(ビレンゼピン塩酸塩水和物)が出過ぎる胃酸分泌を元からおさえることで、胸やけや胃痛をおさえるとともに、荒れた胃粘膜を保護します。さらに消化酵素が働き食後の胃の負担を軽くしてくれます。



⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- ① 次の人は服用しないでください
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 透析療法を受けている人。
- ② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬、乗物酔い薬
- ③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
- ④ 長期連用しないでください



相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 授乳中の人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。 排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。 緑内障、腎臓病
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気、胃部膨満感 |
| 循環器 | 動悸 |
| 泌尿器 | 排尿困難 |
| その他 | 目のかすみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症状 |
|-------------|--|
| アナフィラキシー様症状 | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |

(表面のつづき)

- ⑤服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、便秘、下痢
- ④2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- 胃痛、胸やけ、胃酸過多、胸つかえ、げっぷ
- 胃もたれ、胃重、胃部不快感、胃部膨満感
- はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ
- 食べ過ぎ、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化促進、食欲不振

用法・用量

次の1回量を1日3回、毎食後に水又はぬるま湯で服用してください。

| 年齢 | 成人(15才以上) | 15才未満 |
|-----|-----------|----------|
| 1回量 | 1包 | ×服用しないこと |

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。

成分と作用

3包(1日量)中

| 成分 | 3包中 | 作用 |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
| ピレンゼピン塩酸塩水和物 <M ₁ ブロッカー> | 47.1mg (ピレンゼピン塩酸塩 無水物として45mg) | 出過ぎる胃酸の分泌を抑えます。 |
| メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム | 900mg | 胃酸を中和するとともに胃粘膜を保護します。 |
| 炭酸水素ナトリウム | 1,200mg | 胃酸をすみやかに中和します。 |
| ビオチンアスターゼ2000 | 30mg | 食物の消化を促します。 |

添加物：無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ステアリン酸Mg、ℓ-メントール

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限をすぎたものは服用しないでください。



お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 電話0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒163-1488 東京都新宿区西新宿 3-20-2
<https://www.ssp.co.jp/>