

# 龍角散 鼻炎 朝夕 カプセル

## 鼻炎用内服薬

龍角散鼻炎朝夕カプセルは、抗アレルギー作用の持続時間が長いクレマステンフマル酸塩と生薬成分サイシンエキスを同時に配合しました。花粉症などのアレルギー性鼻炎によるくしゃみや鼻みず、鼻づまりを長時間にわたり緩和します。クレマステンフマル酸塩は「眠くなる」「口がかわく」といった副作用が比較的少ない成分です。

また抗アレルギー作用のある生薬成分サイシンエキスが、からだにやさしく鼻みずなどのアレルギー症状を改善します。グリチルリチン酸二カリウムは鼻粘膜の炎症をしずめ、鼻の通りをよくします。

朝・夕1カプセルずつの服用で1日24時間効果が続きます。



### 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- この医薬品を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。  
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
- 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください。  
(眠気があらわれることがあります)
- 長期連用しないでください。



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦または妊娠していると思われる人
  - 授乳中の人
  - 高齢者
  - 本人または家族がアレルギー体質の人
  - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 次の症状のある人  
高熱、排尿困難、むくみ
  - 次の診断を受けた人  
緑内障、心臓病、高血圧、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください。
  - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる

- 5～6日間服用しても症状がよくならない場合

- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。  
口のかわき

## 【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

## 【用法・用量】

次の量を、朝・夕に水または温湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1カプセル	2回
15歳未満	服用しないでください	

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) カプセルの取り出し方：右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



## 【成分・分量】2カプセル（1日量）中

成分	含量	主なはたらき
クレマスチンフマル酸塩	1.34mg	抗ヒスタミン作用により、鼻みず、鼻づまりなどを持続的におさえます。
グリチルリチン酸二カリウム	50mg	抗炎症作用、抗アレルギー作用により、くしゃみ、鼻みずなどをおさえます。
サイシンエキス （原生薬換算量）	60mg （600mg）	抗アレルギー作用により、くしゃみ、鼻みずなどをおさえます。

添加物：白糖、エチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、マクロゴール、タルク、ゼラチン、三酸化鉄、酸化チタン、ラウリル硫酸Na、青色1号

## 【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限（外箱に記載）をすぎた製品は服用しないでください。

販売名：龍角散鼻炎朝夕カプセル

### — お問合わせ先 —

株式会社龍角散 [お客様相談室]

電話：03-3866-1326

時間：10:00～17:00（土・日・祝日は除く）



株式会社 **龍角散**

千葉県香取郡多古町水戸字水戸台1460番地3  
本社所在地：東京都千代田区東神田2-5-12

### — メモ —

購入店など記入してください。