



すばやく浸透、しっかり治療


鎮痒消炎剤

液体ムヒ[®]_{S_{2a}}

販売名：液体ムヒS_{2a}**この製品の特長**液体ムヒS_{2a}は、

- 「かゆみ」にすばやく、「はれ・赤み」にしっかり効きます。
これらの症状を引き起こすメカニズムは、それぞれ違います。
液体ムヒS_{2a}には、各々のメカニズムに作用する異なる2つの有効成分が配合されています。

①かゆみに

ジフェンヒドラミン塩酸塩
が効く

②はれ・赤みの

もとになる炎症に
デキサメタゾン酢酸エステル
が効く

【模式図】

- サラッとして使用感の良い液体です。
 - ・ シャープな清涼感が得られます。
 - ・ さわやかなハーブ系の香りですので、周囲を気にせず使用できます。

**使用上の注意****してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1)水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- (2)創傷面、目の周囲、粘膜等。

2. ステロイド成分を含んでいるため、同じ部位に長期連用しないでください（目安として顔面で2週間以内、その他の部位で4週間以内）

特に顔面の広範囲に続けて長く使用すると赤ら顔のようになります。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬や化粧品等によりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
- (4)患部が広範囲の人。
- (5)湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談してください

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
患 部	みずむし・たむし等の白せん症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- (2)5～6日間使用しても症状がよくならない場合。


効能

かゆみ、虫さされ、皮ふ炎、かぶれ、じんましん、しっしん、しもやけ、あせも

用法・用量


1日数回、適量を患部に塗布してください。

容器の使用方法



塗布部を患部に数回ゆっくり押し当て、ラバーに薬液を充分しみ込ませてください。(薬液が出にくい場合は、手の甲など肌の固いところに押し当ててください。)

※同じ部位に他の軟膏・クリーム剤を併用するとラバーを傷めることができます。



薬液がラバーに充分しみ込んだことを確認した後、患部に塗布してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後6ヶ月以上です。
- (3)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

成分とそのはたらき

有効成分 (100mL中)

成 分	分 量	は た ら き
デキサメタゾン酢酸エステル	25mg	かゆみ、はれ・赤みのもととなる炎症をおさえるステロイド成分です。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	かゆみをおさえます。
l-メントール	3.5g	清涼感を与え、かゆみをしづめます。
dL-カンフル	1.0g	清涼感を与え、かゆみをしづめます。
グリチルレチン酸	0.2g	生葉由来成分で、かぶれなどの炎症をしづめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります。

添加物としてBHT、クエン酸、クエン酸Na、エタノールを含有します。

<液体ムヒS2aに配合されているステロイド成分について>

虫さされ、かゆみの治療には、かゆみをすみやかにしかもしっかりとおさえ、搔きこわし等による悪化を防ぐことが重要です。ステロイド成分は、虫さされ等によるアレルギー性の炎症をおさえますので、主にかゆみの長期化と悪化の回避に有効にはたらきます。特に、ダニやノミなどによるかゆみには、ステロイド成分が適しています。

ステロイド成分による副作用は、皮ふが薄い顔や首等にあらわれやすく、顔の場合は、お酒を飲んだ時のように赤ら顔になることがあります。これらは、主に長期継続使用した場合に発生します。液体ムヒS2aに配合されているデキサメタゾン酢酸エステルは、作用緩和なステロイド成分ですので、虫さされ等小さな患部に短期間使用する場合には副作用はほとんどありません。同じ部位に継続して使う場合は、顔には2週間以内、その他の部位は4週間以内を目安にしてください。早めに使って早めに治すことが、ステロイド成分配合剤の上手な使い方です。

保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2)高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)火気には近づけないでください。
- (5)次の物には付着させないでください。(変質する場合があります。)
床や家具などの塗装面、メガネ、時計、アクセサリー類、プラスチック類、化繊製品、皮革製品等。
- (6)使用期限(ケース底面及び容器底面に西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないでください。
使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。
- (7)液もれを防ぐためキャップをしっかりと閉めてください。

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地
☎ 076-472-0911 (電話受付時間：月～金 (祝日を除く) 9:00～17:00)

製造販売元



株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡上市町神田16番地

®登録商標

SS03