

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

ピタシーローヤル3000(滋養強壯薬)

使用上の注意[相談すること] 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
／皮膚：発疹／消化器：吐き気・嘔吐・胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
／軟便、下痢 3.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

成分・分量 1日量(100mL)中 タウリン3,000mg、ニンジンエキス40.3mg(原生薬換算量600mg)、イカリソウ流エキス0.3mL(原生薬換算量300mg)、乳酸カルシウム水和物310mg、ローヤルゼリー50mg、ペンフォチアミン(ビタミンB1誘導体)10mg、リポフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)25mg、ニコチン酸アミド30mg、無水カフェイン50mg 添加物：液糖、D-ソルビトール、pH調節剤(クエン酸)、安息香酸Na、香料(エタノール、プロピレングリコール、バニリン、グリセリン)

●ビタミンB2により尿が黄色くなることがある。

効能・効果 ○滋養強壯○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

常盤薬品

NOEVIR GROUP

第2類医薬品

滋養強壯・栄養補給

ピタシーローヤル

3000

タウリン3000mg

ローヤルゼリー、人参
イカリソウ配合

用法・用量 成人(15才以上)1日1回、1びん(100mL)を服用すること。●**用法・用量**を守る。●**保管および取扱い上の注意** (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)生薬を含むため、まれに混濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。



4

987156 000978

常盤薬品工業株式会社
NOEVIR GROUP

001203
AL1805

本社 神戸市中央区港島中町6-13-1

製造販売元 三重県伊賀市白檜字永谷2604-5

お問い合わせは 0120-875-710まで

www.tokiyayakuhin.co.jp

副作用被害救済制度 0120-149-931

金属：キャップ 使用期限

ガラス：びん

100mL 製造番号