


ご使用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要時にそなえて大切に保管してください。

第2類医薬品



皇漢堂漢方便秘薬

皇漢堂漢方便秘薬は、生薬の大黃に甘草を配合した漢方処方「大黃甘草湯」を主成分としており、これは「金匱要略」に掲げられている漢方処方です。古来より広く便秘薬として用いられています。甘草が大黃の作用をコントロールし、大腸の働きを調節して、就寝前に服用すれば翌朝、おだやかなお通じが期待できる便秘薬です。



⚠️ [使用上の注意]

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
3. 大量に服用しないでください。

相談すること 🏠

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、悪心・嘔吐
 - (6) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (7) 胃腸が弱く下痢しやすい人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師または薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛、悪心・嘔吐

(2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。

下痢

(裏面もお読みください)

〔成分〕 1日量（4錠）中
下記の混合生薬より抽出した大黃甘草湯エキス（「漢方診療医典」（南山堂）、2/5量）400mgを含有する。

〔ダイオウ……………1600mg
〔カンゾウ…………… 400mg
添加物として、セルロース、アメ、メタケイ酸アルミン酸
マグネシウム、ステアリン酸マグネシウムを含有します。



＜成分に関連する注意＞

本剤の服用により尿が橙色ないし赤色になることがありますが、ダイオウによるものですので心配ありません。

〔効能・効果〕

便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和

＜効能・効果に関連する注意＞

体力に関わらず、使用できます。

〔用法・用量〕

次の1回量を就寝前に水またはお湯でかまずに服用してください。
ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量または減量してください。

年 齢	1 回 量		1日服用回数
	2～3日便通がないとき	4日以上便通がないとき	
成人（15歳以上）	1錠～3錠	2錠～4錠	1 回
5歳以上15歳未満	半錠～1錠半	1錠～2錠	
5歳未満の乳幼児	服用しないこと		

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 月経時は服用量を控えめにしてください。

〔保管および取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。
- (4) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、フタをあけた後はすててください。
- (5) 箱およびビンの「開封年月日」記入欄に開封した日付を記入し、添付文書とともに箱に入れたまま保管してください。
- (6) 一度開封した後は、品質保持の点から6ヵ月以内に服用してください。なお使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (7) 本剤は生薬（薬用の草根木皮）を用いた製品ですから、製品により錠剤の色調が多少異なることがありますが、効果は変わりません。

本製品についてのご相談は、お客様相談窓口までお願い致します。

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-023520

受付時間 平日9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号

皇漢堂製薬株式会社