

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。眼科用薬

ハード・02

レンズ装着中にも
使用できます。

目のかゆみ・結膜充血に

第2類医薬品

ロートアルガード® クールEX

容量1.3mL

かゆみがつらい目に
防腐剤[※]無添加

クール感
持続力強化型

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師
にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質
の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を
起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人…はげしい目
の痛み
- (5) 次の診断を受けた人…緑内障

2. 次の場合は、直ちに

使用を中止し、この説明書を持って
医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた
場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

- (2) 目のかすみが改善されない場合
- (3) 5～6日間使用しても症状がよく
ならない場合



効能・効果

- 目のかゆみ
- 結膜充血
- 眼瞼炎(まぶたのただれ)
- 目のかすみ(目やにの多いときなど)



- 眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗
が目に入ったときなど)
- 紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)
- 目の疲れ
- ハードコンタクトレンズを装着して
いるときの不快感

用法・用量

1回1～2滴、1日3～6回点眼してください。

●用法・用量に関連する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶ
しさを感じたり、かえって充血を
招くことがありますので用法・
用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、
保護者の指導監督のもとに
使用させてください。

(3) 容器の先をまぶた、
まつ毛に触れさせ
ないでください。〔汚
染や異物混入(目
やにやホコリ等)の
原因となる〕また、
混濁したものは使
用しないでください。

容器の先と



目やまつ毛が
ふれることの
ないように

- (4) ソフトコンタクトレンズを装着し
たまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみご使用ください。

有効成分

アズレンスルホン酸ナトリウム
(水溶性アズレン)

配合量 0.02%

生薬由来成分で炎症を抑え、かゆみ・充血に効果的です。紫色の薬液は成分本来の色で、効果を発揮する成分を抽出して配合しています。

クロルフェニラミンマレイン酸塩

配合量 0.03%

ヒスタミン(アレルギー原因物質)をブロックし、かゆみを抑えます。

塩酸テトラヒドロゾリン

配合量 0.02%

血管を収縮させ、充血を除去します。

ビタミンB₆

配合量 0.1%

目に栄養を補給し、新陳代謝を促進します。

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、等張化剤、アルギン酸、*l*-メントール、*d*-カンフル、ペパーミントオイル、プロピレングリコール、ポリソルベート80、pH調節剤を含有します。

※防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラベン)を配合していません。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置



しないでください。※有効成分の水溶性アズレンは光に当たると分解して退色するので、使用後はキャップをしっかり締めて添付のケースに入れ、日光や蛍光灯に当たらないようにして、保管してください。なお水溶性アズレンの紫色は、服などにこぼれても、水洗いで簡単に落ちます。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。



(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になりたり品質が変わる)

(4) 他の人と共用しないでください。

(5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。

(6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。

(7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

※製剤をとどめるため、点眼後薬液が粘度をもつようにしております。そのため、点眼後、視界がぼやけることがありますのでご注意ください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO **ロート製薬株式会社**

大阪市生野区巽西1-8-1

400522903