

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

目薬

新V・ロートEX

第2類医薬品

新 V.ロートEX ROHTO®

目の疲れ・充血に

13mLと大容量20mLの2タイプがあります。用途に合わせてお選びください。



「新V・ロートEX」です。

その気持ちよさと効き目感が

目全体にゆきわたる、

症状を緩和します。

目のさまざまな

日常起きがちな

8種の有効成分が

配合された

バランスよく

「新V・ロートEX」。

ちょうどよいさし心地の

しみにくい、強すぎない、苦い味がしない…

目に広がってゆく、
気持ちよさと効き目感。

8種の有効成分をバランスよく組み合わせた
「マルチフォーカス処方」。

【成分】

【はたらき】

● パンテノール

★目の細胞の新陳代謝を促進し

● ビタミンB₆

★目の細胞の新陳代謝を促進し

● L-アスパラギン酸カリウム

★目の細胞呼吸を促進、活性化し

● ネオスチグミンメチル硫酸塩

★ピント調節筋の疲労回復を促し

● 塩酸テトラヒドロゾリン

★結膜（白目の部分）充血を取り除き

● クロルフェニラミンマレイン酸塩

★抗ヒスタミン剤として目のかゆみを

● グリチルリチン酸二カリウム

★組織の起炎物質を抑制し炎症を鎮め

● コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

★涙の成分の一つで角膜表面を保護し

目の疲れに効果的

クリアな瞳に

きちんと鎮める

眼病予防に効果的

より開けやすく、よりさしやすく、より使いやすい容器に変わりました！

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる
フリーアングルノズル®



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

ワンタッチ式スクリュウキャップ



開ける時は左に1回力チッと回し、閉める時も
右に1回力チッと回すだけ。簡単便利です。

使用上の注意

相談すること



1. 次の人は、使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

- (2) 目のかすみが改善されない場合
- (3) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、目のかすみ(目やにの多いときなど)、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1回2～3滴、1日5～6回点眼してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕
また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。



成 分

パンテノール……………0.1%	クロルフェニラミンマレイン酸塩……………0.01%
ビタミンB ₆ ……………0.05%	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム…0.1%
L-アスパラギン酸カリウム……………1%	ネオスチグミンメチル硫酸塩……………0.005%
グリチルリチン酸二カリウム……………0.1%	塩酸テトラヒドロゾリン……………0.01%

添加物として、アミノカブロン酸、塩化Na、ℓ-メントール、d-カンフル、d-ボルネオール、ゲラニオール、ユーカリ油、プロピレングリコール、ペパーミントオイル、塩化ベンザルコニウム、クロロブタノール、エデト酸Na、ポリソルベート80、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)