

■使用上の注意/**してはいけないこと**(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 1.次の人は服用しないでください  
透析療法を受けている人。2.長期連用しないでください **相談すること**  
1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)次の診断を受けた人。腎臓病 2.2週間位服用しても症状がよくなる  
ない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販  
売者に相談してください

■保管及び取扱い上の注意/(1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい  
所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。  
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が  
変わります。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

販売名 液キャベコーワ

**第2類医薬品**

●お問い合わせ先 興和(株)お客様相談センター TEL03-3279-7755

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

胃腸薬

*Kowa*

液キャベコーワ

もたれ ムカムカ はきけ

■効能・効果/もたれ、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃の  
むかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ、食べ過ぎ、胃部・腹部膨満感、消  
化不良、胸やけ、胸つかえ、食欲不振、胃弱

■成分・分量(50mL中)/合成ヒドロタルサイト400mg オキソアミジン末  
30mg 人参乾燥エキス90mg オウレン流エキス-B0.3mL 生姜流エキス0.3  
mL ゴシユ流エキス0.3mL 蒼朮流エキス0.4mL ウルソデオキシコール  
酸15mg カンゾウエキス末86mg〔添加物〕白糖、安息香酸Na、パラベン、  
セルロース、カルメロースNa、ポビドン、l-メントール、香料、エタノール

■用法・用量/成人(15歳以上)  
1日1回、1本を服用してください。

●用法・用量を厳守してください。

●懸濁内服液なので服用の際、瓶を  
よく振ってください。

製造販売元

興和株式会社

東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

02K