

毎日のつらい痛み  
サロンパス® EX インドメタシン 3.5%  
微香性 鎮痛消炎プラスター

**商品の特長**

インドメタシン3.5%配合の優れた鎮痛消炎効果。

しなやか素材採用でやさしい貼り心地でかぶれ難い。

肩こりの関係部位（肩、首の付け根、肩甲骨周辺）などに貼りやすいコンパクトサイズ。

微香性なので使っていることが気にならない。

**⚠ 使用上の注意**

**❌ してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 11歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください。

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、かぶれ

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】表面のプラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として、患部に貼ってください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (3) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。
- (4) 皮膚の特に弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。

成分	含量(膏体100g中)
インドメタシン	3.5g
l-メントール	3.5g

添加物として、BHT、脂環族飽和炭化水素樹脂、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他3成分を含有します。

#### 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部をおりまげきちんと閉めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。

《包装》 5.4cm×8.56cm ..... 20枚入、40枚入

本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社**

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

お客様相談室：〒100-6221 東京都千代田区丸の内1-11-1

☎0120-133250 受付時間：9:00～12:00、13:00～17:50（土・日・祝日を除く）