

つらい関節・筋肉の痛みに深く浸透して効く

フェイタスシップ

フェルビナク配合シップ剤

商品の特長

優れた抗炎症・鎮痛効果のある「フェルビナク」を1枚あたり70mg配合した鎮痛消炎シップ剤です。

「フェルビナク」は痛みに関係する物質（プロスタグランジン）の生成を抑え、腰・肩・関節・筋肉の痛みに優れた効きめを発揮します。

優れた冷却力が持続し、炎症をすみやかに抑える事ができます。

強い粘着力とタテ・ヨコ・ナナメに伸縮自在の不織布を使用していますので、動きの激しい部位にもピッタリフィットします。

左右に引っばるだけでフィルムがはがせる「バリビタシート採用」なので、どんな部位でも簡単に貼る事ができます。

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 今までに本剤によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど）を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれなど

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】1日2回を限度として、患部に貼ってください。

用法・用量に関連する注意

- (1)定められた用法を守ってください。
- (2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3)患部の皮ふは清潔にして貼ってください。

【成分・分量】

成分	含量(膏体100g中)
フェルピナク	0.7g

添加物として、エデト酸Na、グリセリン、ケイ酸Al、酸化チタン、酒石酸、ゼラチン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸Mg、N-メチル-2-ピロリドン、*l*-メントール、その他3成分を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光や高温をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保証するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)使用期限(薬袋に記載)をすぎた製品は使用しないでください。
- (5)開封後はチャックをしっかりとめて保存してください。

《包装》10cm×14cm 12枚入、24枚入

本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社**

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

お客様相談室：〒100-6221 東京都千代田区丸の内1-11-1

☎0120-133250 受付時間：9:00～12:00、13:00～17:50(土・日・祝日を除く)