

イソジン[®]のどフレッシュ

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人
2. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
 - (1) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (2) 授乳中の人は
 - (3) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
 - (4) 次の症状のある人 □内のひどいだれ
 - (5) 次の診断を受けた人 甲状腺機能障害

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症状	関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	消化器	吐き気
□	あれ、しみる、灼熱感、刺激感	その他	不快感

まれに下記の重篤な症状があこることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

効能・効果

のどの炎症によるのどのあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

用法・用量

1日数回 適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- ノズルをのどの患部にむけて、アーッと声を出しながら2~3回直射してください。(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがあります。)
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 本剤はのどの患部への噴射塗布のみに使用し、キズややけどへの使用や、内服はしないでください。
- 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

成分・分量

1mL中 ポビドンヨード4.5mg(有効ヨウ素として0.45mg)

添加物としてl-メントール、プロピレンジコール、D-ソルベitol液、グリセリン、エタノール、香料、その他1成分を含有しています。

〈成分・分量に関する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯など)が変色することがあります。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当らない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します。)
- (4) 衣服などに付着すると着色しますのでご注意ください。
なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落としてください。
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) ノズルの先端を針などで突くと折れたときに大変危険ですので、絶対にやめてください。
- (7) 本剤を使用していると最後に噴射しきれずに容器内に薬液が残りますが、表示された内容量を噴射できるよう考慮した量を入れてあります。
- (8) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



シオノギヘルスケア株式会社 大阪府大阪市中央区北浜2-6-18



ムンディファーマ株式会社 東京都港区港南2-15-1