



パオラス®C2000

シミ・日焼けによる色素沈着に

フレッシュパイナップル味

Pineapple

Vitamin C

chewable tablets

2000 mg

チュアブル錠

第3類医薬品

1日4錠

第3類医薬品

ビタミンC製剤

販売名：パオラスC2000

【用法・用量】

次の量をかむか、口中で溶かして服用してください。

ただし、1日2回服用する場合は、朝夕に服用してください。

年 令	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2錠	1回~2回
7才以上15才未満	1錠	
7才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1.小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2.定められた用法・用量を守ってください。

【成分・分量】成人1日最大服用量(4錠)中
 アスコルビン酸(ビタミンC)として……2000mg
 [アスコルビン酸(ビタミンC)……1000mg
 L-アスコルビン酸ナトリウム……1124.79mg
 (ビタミンCとして1000mg)]

リボフラビン(ビタミンB₂)……6mg

添加物としてトウモロコシデンプン、ポビドン、乳糖、粉末還元麦芽糖水アメ、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、スクラロース、アセスルファミカリウム、白糖、香料を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

- 1.尿及び大便の検査を受ける場合には、本剤を服用していることを医師に知らせてください。(尿及び大便の検査値に影響を及ぼすことがあります。)
- 2.本剤の服用により尿が黄色くなることありますが、リボフラビンによるものなので心配ありません。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

この箱の記載事項は服用前に必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう本剤を入れて保管してください。

⚠️ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」

次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

開封口

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。なお、本剤は吸湿しやすい製剤なので、服用のつどビンのフタをしっかりと閉めてください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わるのを防ぐため。)
4. ビンの中の詰め物は、錠剤の破損を防止するために入れてありますので、開栓後は捨ててください。
5. 乾燥剤は、最後まで捨てずに使用してください。(湿気により錠剤の色が変わることがあります。)
6. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願いいたします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎(06)6351-2100(代表)

受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)



KUDA 奥田製薬株式会社

大阪市北区天満1丁目4番5号

<http://www.okudaseiyaku.co.jp>