

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

＜日本薬局方 セチリジン塩酸塩錠＞

**CONTACT Z**  
新コンタック鼻炎Z

アレルギー専用鼻炎薬

アレルギー性鼻炎症状を  
抑える、鎮める、ひどくしない。

1日1回1錠で効く!

- 寝る前に1錠ですぐれた効果を発揮
- しっかり効いて眠くなりにくい抗アレルギー成分を配合 ※服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
- 飲みやすい、直径約7ミリの小さな錠剤

## △ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください  
(1) 本剤又は本剤の成分、ピペラジン誘導体(レボセチリジン、ヒドロキシジンを含む)によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2) 次の診断を受けた人。 腎臓病  
(3) 15歳未満の小児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他のアレルギー用薬(皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む)、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬等)及びテオフィリン、リトナビル又はビルシカイニド塩酸塩水和物を含有する内服薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
5. 服用前後は飲酒しないでください



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 次の診断を受けた人。 肝臓病、てんかん  
(3) けいれん発作を起こしたことがある人。  
(4) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(5) 高齢者。  
(6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(7) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。  
(8) 気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎等の他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位  | 症 状                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 精神神経系 | 倦怠感、頭痛、頭重感、ふらふら感、しびれ感、めまい、浮遊感、不眠、ふるえ、抑うつ、自殺願望、興奮、攻撃性、無力感、知覚異常、幻覚、意志に反する体の動き、意識消失、健忘、悪夢 |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、消化不良、腹痛、腹部不快感、胃痛、口唇炎、口唇の乾燥感、味覚異常、口内炎、腹部膨満感、食欲亢進、舌のはれ                 |
| 循環器   | 動悸、血圧上昇、不整脈                                                                            |
| 皮 膚   | 発疹・発赤、じんましん、むくみ、かぶれ、かゆみ、水ぶくれ                                                           |
| 目     | 充血、かすみ、異常な眼球の動き、まぶたのはれ                                                                 |
| 呼吸器   | 息苦しさ、せき                                                                                |
| 泌尿器   | 尿蛋白、尿糖、頻尿、血尿、排尿困難、尿失禁                                                                  |
| その他   | 耳なり、月経異常、胸痛、ほてり、関節痛、手足のこばり、嗅覚異常、鼻出血、脱毛、体重増加、筋肉痛、発熱                                     |

(裏面に続く)

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称          | 症 状                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| ショック(アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
| けいれん           | 筋肉の発作的な収縮があらわれる。                                            |
| 肝機能障害          | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。           |
| 血小板減少          | 血液中の成分である血小板の数が減ることにより、鼻血、歯ぐきからの出血、青あざ等の出血症状があらわれる。         |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、便秘、下痢、眠気

### 【効 能】

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:  
くしゃみ、鼻みず、鼻づまり

### 【用法・用量】

下記の1回量を水又はお湯と一緒に服用してください。

| 年齢        | 1回量     | 1日服用回数  |
|-----------|---------|---------|
| 成人(15歳以上) | 1錠      | 1回(就寝前) |
| 15歳未満の小児  | 服用しないこと |         |

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 花粉など季節性アレルギー性鼻炎による症状に使用する場合は、花粉飛散期に入って症状が出始めたら、症状の軽い早い時期からの服用が効果的です。
- (3) 1週間服用しても症状の改善がみられない場合又は症状の改善がみられても2週間を超えて服用する場合は、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- (4) 錠剤の取り出し方:右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



### 【成分・分量と働き】

1錠中

| 成分       | 分量   | 働き                                |
|----------|------|-----------------------------------|
| セチリジン塩酸塩 | 10mg | 花粉、ハウスダストなどによるくしゃみ、鼻みず、鼻づまりを抑えます。 |

添加物:乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、ステアリン酸Mg、セルロース、無水ケイ酸

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

### 【お問い合わせ先】

- (1) 購入した薬局・薬店
- (2) グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社  
お客様相談室  
【電 話】0120-099-301  
【受付時間】9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

コンタックの他の製品情報やかぜと鼻炎に関する様々な情報は、[contac.jp](http://contac.jp)へ

発 売 元: グラクソ・スミスクライン・  
コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社  
〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1

製造販売元: サンノーバ株式会社

〒370-0426 群馬県太田市世良田町3038-2

SU13094-1