

血清高コレステロール改善薬
血中の余分な脂質をとる
コレストン®

第3類医薬品

高コレステロールは、自覚症状がなく、自分では気づきにくい症状です。本商品の服用後は定期的に医療機関でコレステロール値の測定をすることをお勧めします。

商品の特長

- 『コレストン』は、血清高コレステロールを改善し、また、血清高コレステロールに伴う末梢血行障害（手足の冷え・しびれ）を緩和する医薬品です。
 - 大豆由来成分の「大豆油不けん化物」が腸管からの余分なコレステロールの吸収を抑制し、排泄を促します。
 - パンテチンは、肝臓におけるコレステロールの代謝を改善。LDL（悪玉）コレステロールの分解を促し、またHDL（善玉）コレステロールを増加させ、血液中の余分なコレステロールをとり、血管壁への沈着を抑えます。
 - 天然型ビタミンE（酢酸d- α -トコフェロール）は過酸化脂質の生成を抑え、血流をスムーズにし、末梢血行障害（手足の冷え・しびれ）を緩和します。
- 『コレストン』はこれら3つの有効成分の力により効果を発揮します。

⚠️【使用上の注意】

相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
医師の治療を受けている人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、胃部不快感、胸やけ、食欲不振、腹痛、はきけ

(2) 1ヶ月位服用してもコレステロール値の改善がみられない場合。
(1ヶ月ほど服用後、医療機関でコレステロール値の測定をすること。)
- 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。
出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。
- 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
下痢、軟便

【効能・効果】 血清高コレステロールの改善、血清高コレステロールに伴う末梢血行障害（手足の冷え・しびれ）の緩和

【用法・用量】 次の量を食後に水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2カプセル	3回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 血清高コレステロールの改善には食事療法が大切なので、本剤を服用しても食事療法を行ってください。

【成分・分量】 成人1日量（6カプセル）中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量	はたらき
パンテチン （80%パンテチン水溶液）	375mg	肝臓におけるコレステロール代謝の促進により、血液中の過剰なコレステロールを減少させ、血管壁への沈着を抑えます。
大豆油不けん化物 （ソイステロール）	600mg	大豆由来の成分で、腸管からのコレステロールの吸収を抑制し、排泄を促進します。
酢酸d-α-トコフェロール （天然型ビタミンE）	100mg	抗酸化作用により、過酸化脂質の生成を抑制し、末梢血行障害を改善します。

添加物としてサフラワー油、ポリソルベート80、カプセルにグリセリン、酸化チタン、サンセットイエローFCF、ゼラチン、D-ソルビトールを含んでいます。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。また、服用のつどビンのフタをしっかりとめてください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元

**久光製薬株式会社**
〒841-0017 鳥栖市田代大官町408
お客様相談室：〒100-6221 東京都千代田区丸の内1-11-1
☎0120-133250 受付時間：9:00～12:00、13:00～17:50（土・日・祝日を除く）

製造販売元

東海カプセル株式会社
〒419-0202 静岡県富士市久沢168番地