

この添付文書は、服用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように保管してください。

せき・たんに [鎮咳去痰薬]

第②類医薬品

# ペリコデ<sup>®</sup>せきどめ顆粒

《シャゼンソウエキス・セキサンエキス・カンゾウエキス配合》

せきは、もともと喉や気管などの分泌物や侵入してきた異物を除去するための防御機構です。しかし、あまり過度になると、体力を消耗し、病気の回復が遅れ、さらに余病を併発する場合があります。

ペリコデせきどめ顆粒は、はやく溶けて、せきをしずめ、たんの分解や排出を助ける効果があります。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないでください

\*12才未満の小児

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等  
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがあります)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合には授乳を避けてください

5. 過量服用・長期連用しないでください



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。高熱、むくみ、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合には、副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合には直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

便秘、口のかわき、眠気

4.5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

## ■ 効能・効果

せき、たん

## ■ 用法・用量

1日3回、食後なるべく30分以内に次の量を服用してください。

年 齢	1回量	年 齢	1回量
15才以上	1包	12才～15才未満	$\frac{2}{3}$ 包

・12才未満の小児は服用しないでください。

### 【用法・用量に関連する注意】

- (1)用法・用量を必ず守ってください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## ■ 成分と働き


1包(2g)中に次の成分を含んでいます。

成 分	含 量	働 き
ジヒドロコデインリン酸塩	10mg	せき中枢に働き、せきをとめます。
ノスカピン	20mg	速効性のあるせきどめ薬です。
グアヤコールスルホン酸カリウム	90mg	気道の分泌液を増やし、たんを出しやすくします。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	25mg	気管支を広げ、呼吸を楽にして、せきをしずめます。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1.33mg	アレルギー性のせきをしずめます。
シャゼンソウエキス (原生薬換算量338mg)	50.6mg	せきをしずめ、たんをきる効果があります。
カンゾウエキス (原生薬換算量600mg)	200mg	炎症をおさえます。
セキサンエキス (原生薬換算量96mg)	12mg	たんを排出させる効果があります。

添加物として無水ケイ酸、乳糖、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロースを含んでいます。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

## お問い合わせ先

本剤の服用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話 03-3952-0100  
月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)



製造販売元  
**三宝製薬株式会社**  
東京都新宿区下落合2-3-18