

表面の矢印から開封してください。(裏面から切ると段差がつきます。)

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

## 経皮鎮痛消炎剤 パスティム<sup>®</sup> LX プレミアム 第2類医薬品 品番：PLP7

チャック 開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。 包装 | 7cm×10cm 7枚入

### ⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人(3) 15歳未満の小児

2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口  
(3) みずむし・たまし等又は化膿している患部

3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。

4. 連続して2週間以上使用しないでください。(本剤は痛みを一時的におさえるものではありません。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください)



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受ける人(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人(4) 高齢者(5) 次の診断を受けた人 気管支ぜんそく

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性が

ありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢・軟便

4. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(他の疾患の可能性があります)

### 効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

### 用法・用量

表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付してください。

<用法・用量に関する注意>

(1) 用法・用量を厳守してください。(2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(3) 1日あたり4枚を超えて使用しないでください。(4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。(5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

### 成分・分量

膏体100g中 [1枚あたり(7cm×10cm) 膏体1g]  
ロキソプロフェンナトリウム水和物···5.67g(無水物として5g)  
L-メントール···3.00g  
トコフェロール酢酸エステル···2.30g

添加物: 斯チレン-1,4-ジエン-5-チルブロッカ共重合体、ポリイソブチレン、脂環族飽和炭化水素脂質、水素添加ロジングリセリンエスティル、流動パラフィン、ジプチルヒドロキシトルエン、その他3成分

### 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない温湿の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。誤用の原因になったり品質が変わります。(4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋をきちんと閉めて保管してください。(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、アルミ袋を開封した後は、なるべく早く使用してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造  
販売元



祐徳薬品工業株式会社

佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1

[お客様相談窓口] TEL.0954-63-1320

受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

日本製



4 987235 024406

製造番号

使用期限

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

包装 | 7cm×10cm 14枚入(7枚/袋×2袋)

使用開始日をご記入ください。

経皮鎮痛消炎剤

# パスタイムLXプレミアム 第2類医薬品

## ▲ 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

#### 1. 次の人は使用しないでください。

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人 (3) 15歳未満の小児

#### 2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 温疹、かぶれ、傷口 (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部

#### 3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。

#### 4. 連続して2週間以上使用しないでください。(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください)

### ⚑ 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 高齢者 (5) 次の診断を受けた人 気管支ぜんそく

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある

ありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明文書を持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢・軟便  
4. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(他の疾患の可能性があります)

### 功能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

### 用法・用量

表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付してください。

#### <用法・用量に関する注意>

(1) 用法・用量を厳守してください。(2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(3) 1日あたり4枚を超えて使用しないでください。(4) 汗をかいだり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。(5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤・かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

### 成分・分量

膏体100g中 [1枚あたり(7cm×10cm) 膏体量1g]  
ロキンプロフェナトリウム水和物···5.67g(無水物として5g)  
L-メントール···3.00g  
トコフェロール・酢酸エチル···2.30g

添加物: スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ポリイソブレン、脂環族飽和炭化水素樹脂、水素添加ロジン/グリセリンエステル、流動パラフィン、ジプチルヒドロキシトルエン、その他3成分

### 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。誤用の原因になったり品質が変わります。(4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋をきちんと閉めて保管してください。(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、アルミ袋を開封した後は、なるべく早く使用してください。

日本製

製造番号

使用期限



製造販売元



祐徳薬品工業株式会社

佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1

[お客様相談窓口] TEL.0954-63-1320

受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)