

服用の前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。

非ピリン系
解熱鎮痛薬

プレミナスACa

- プレミナスACaは、熱や痛みを速やかにおさえる解熱鎮痛成分アセトアミノフェンの錠剤です。
- 7才のお子様から成人まで幅広くお使いいただけます。
- 眠くなる成分は含まれておりません。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
3. 服用前後は飲酒しないでください
4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

症状の名称	症 状
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の 広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブ ツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続 したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、 食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛 む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、 空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

- 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・
打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

【用法・用量】

次の量をなるべく空腹時をさけて服用してください。
服用間隔は4時間以上おいてください。

年 令	1回量	服用回数
成人（15才以上）	2錠	1日3回
7才以上15才未満	1錠	
7才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【錠剤の取り出し方】

錠剤の入っているPTPシートの
凸部を指先で強く押して裏面の
アルミ箔を破り、取り出してお飲
みください。



(誤ってそのまま飲み込んだり
すると、食道粘膜に突き刺さる等
思わぬ事故につながります)

【成分・分量】 2錠中

成 分	分 量	は た ら き
アセトアミノフェン	300mg	熱を下げ、痛みをおさえます

添加物:セルロース、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水
ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるのを防ぐため)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願いいたします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎06-6351-2100 (代表) 受付時間9:00～17:00 (土日祝日を除く)

発売元
奥田製薬株式会社
大阪市北区天満1丁目4番5号
<https://www.okudaseiyaku.co.jp/>

製造販売元
大昭製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168