

水虫・たむし治療薬 プテナフィン塩酸塩配合

**殺菌力**  
かゆみ止め成分  
抗菌成分

**プテナロックV $\alpha$ エア**

『かゆみ止め成分+冷却力』のW効果でかゆみを抑えます!!

患部にピンポイントで噴射できる「ジェット式」なので、直接手を触れることなく簡単・清潔に使用できます。

### ⚠️【使用上の注意】

**❌してはいけないこと** [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

#### 1. 次の人は使用しないでください。

本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。

#### 2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目や目の周囲、顔面、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



#### ■相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 乳幼児。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 患部が広範囲の人。
- (7) 患部が化膿している人。
- (8) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

#### 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、落屑、ただれ、水疱、亀裂


- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合、又、本剤の使用により症状が悪化した場合。

【効能・効果】 みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】 1日1回、適量を患部に噴射塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 患部より約10cmの距離で噴射してください。
- (6) 同じ箇所に連続して3秒以上噴射しないでください。
- (7) 患部に対して容器を下に向けて使用してください。(上向き、横向きでの使用は噴射剤のみが出て、薬液が残り、最後まで使用できなくなります。)



【成分・分量】 (1mL中)

成分	含量
ブテナフィン塩酸塩	10mg
ジブカイン塩酸塩	2mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	5mg
グリチルレチン酸	2mg
l-メントール	20mg
クロタミトン	10mg
イソプロピルメチルフェノール	3mg

添加物として、エタノール、ジエタノールアミン、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、LPGを含有します。

〈成分に関連する注意〉  
アルコールを含有していますので、塗布時にしみることがあります。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップを閉めて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。
- (5)火気に近づけたり、火の中に入れてしないでください。また、使用済みの容器は火中に投げないでください。
- (6)合成樹脂(スチロール等)を軟化したり、塗料を溶かしたりすることがあるので、床や家具などにつかないようにしてください。
- (7)火花が出る所で使用しないでください。

ガス抜きキャップの注意事項と方法 / 分別廃棄の仕方

※下図は商品の説明書です。サンプル品は構造が異なります。

- ①「PUSH」マークを上押し上げられるように押しください。
- ②押しボタンを引き抜きます。
- ③キャップの上部をはずし、平らな所に図の様に置きます。
- ④本体を逆さまにし、噴射口をキャップの受け口に合わせ置きします。
- ⑤本体を「カチッ」と音がするまで押し込み、噴射音が消えるまで放置します。
- ⑥噴射音が完全に消えてから、市町村等で定められた方法により破棄してください。

※必ず中身を使い切ってから、火気のない屋外でガス抜きを行ってください。  
※ガス抜き中は、わずかに残った薬液がガスと共に噴き出しますので、顔を近づけないでください。※  
本品のキャップ以外使用しないでください。

水虫治療の5ポイント

- 1 足が蒸れないように、ふだんから心がけましょう。**  
白癬菌は温度15°C以上、湿度70%以上になると増殖します。常に蒸れを防ぎ、乾燥させることを心がけましょう。
- 2 患部を清潔にしましょう。毎日、石けんでよく洗うことが大切です。**  
1日1回の使用で効果のある商品ですが、患部を清潔にすること、長時間蒸れないように注意する、靴や靴下を不潔なままにしない(こまめに洗う)などの工夫が必要です。
- 3 くすりは患部だけでなく、周囲まで広く、薄く塗りましょう。**  
白癬菌は症状が発生している範囲より広く寄生していることが多いので、薬剤を広めに塗布しましょう。
- 4 症状がなくなっても、水虫薬は最低1ヶ月程度、塗り続けましょう。**  
1ヶ月以上  
症状がなくなっても、白癬菌の活動を抑えているにすぎないこともあります。根気よく継続して塗り続ける事が完治への道です。
- 5 ご家族に水虫の人がいたら、一緒に治療しましょう。**  
ご家族の方に水虫の人がいたら、うつります。おかしいなと思ったら早めの治療を心がけましょう。

水虫の治癒に向けて毎日のトータルフットケアが大切です。

▼本品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の当社「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元 **久光製薬株式会社**

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

お客様相談室：〒100-6221 東京都千代田区丸の内1-11-1

☎0120-133250 受付時間：9:00～12:00、13:00～17:50(土、日、祝日を除く)