

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

オムニードフェルビナク

第2類医薬品

【特長】

- オムニードフェルビナクは、有効成分(フェルビナク)が痛みの原因物質の生成を抑え、痛みを鎮める鎮痛・消炎フェルビナクバップ剤です。
- オムニードフェルビナクは、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ひじやひざにもピッタリフィットします。
- オムニードフェルビナクは、基剤中の水分により、打撲、捻挫等による熱をもった患部を心地よく冷却します。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬や化粧品等によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ等

(2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

（用法・用量に関する注意）

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (4) 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

【成分・分量】 膏体 100g (1枚中 フェルビナク 70mg) 中

フェルビナク……0.5g

添加物として、l-メントール、ジイソプロパノールアミン、カルボキシビニルポリマー、酸化チタン、カオリン、エデト酸Na、D-ソルビトール、プロピレングリコール、クロタミトン、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、グリセリン、pH調整剤、その他3成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。また、未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管してください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。

【包装】

発売元

ティコクファルマケア株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元

帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

(お問い合わせ先)

帝國製薬株式会社 お客様相談室
電話 (0879)25-2363
受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931