

※2008年9月改訂（第2版）
2004年7月作成

速乾性すり込み式手指消毒剤

日本標準商品分類番号 872615

第3類医薬品

消毒用エタプラス[®]

貯法：気密容器
火気を避けて
室温保存
使用期限：容器等に表示

アルコール類 * 水溶性 * 危険等級Ⅱ * 火気厳禁 * 飲用不可

ETHAPLUS[®] FOR DISINFECTION

承認番号	(13AP)56
承認年月	2001年1月
販売開始	2001年9月

【してはいけないこと】☒

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

粘膜（口唇等）、目の周囲、傷口

【相談すること】 ☐

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(4) 患部が広範囲の人。

(5) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感等

3. 長期使用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

【効能効果】 手指・皮膚の殺菌・消毒

【用法用量】 塗擦又はガーゼ、脱脂綿等に浸して清拭してください。

（用法用量に関する注意）

(1) 用法用量を厳守してください。

(2) 局所刺激作用があるので、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないでください。

(3) 過度に使用すると、脱脂等による皮ふ荒れを起こすことがあります。

(4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。

(5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。



(6) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

(7) 外用にのみ使用してください。

■ 手指消毒法

①手のひらに十分にスプレーします。

②手指全体にすり込むよう伸ばし、乾燥するまで、よくすり込みます。



【組成性状】

有効成分	エタノール (C ₂ H ₆ O)	76.9～81.4vol%
添加物	イソプロパノール (溶剤) グリセリン (湿潤剤)	4.9vol% 0.9w/v%
性状	無色透明の液で、特異なにおい及びやくような味があります。	

〈成分に関連する注意〉

アレルギーテストの検査を受ける場合には、本剤を使用していることを医師に知らせてください。（アレルギーテストの検査値に影響をおよぼすことがあります。）

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6)開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けてください。（300mL、500mL、1000mLに記載）

【包

装】 60mL×10、300mL、500mL、1000mL、5L