

服用に際しては、説明文書をよく読むこと

【販売名】マムシゲン内服液

【使用上の注意】相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
関係部位：症状 皮膚：発疹・発赤、かゆみ
消化器：胃部不快感、下痢

2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分・分量】成人1日(100mL)中

日局 チアミン硝化物(ビタミンB₁硝酸塩)…10mg

日局 リボフラビンリン酸エステルナトリウム
(ビタミンB₂リン酸エステル)…3mg

日局 ニコチニン酸アミド…20mg

日局 タウリン…500mg

カルニチン塩化物…100mg

日局 無水カフェイン…50mg

ゴオウ抽出液(原生葉換算:0.5mg)…10mg

マムシ抽出液(原生葉換算:100mg)…0.5mL

ロクジョウ抽出液(原生葉換算:14.5mg)…50μL

添加物:果糖ブドウ糖液糖、ハチミツ、DL-リノ酸、安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料、バニリン(アルコール0.35mL以下)

◆本剤に含有されているリボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂リン酸エステル)により、尿が黄色くなることがあります。

◆本剤に配合されている生葉成分により、混濁又は沈殿を生じることがありますが、品質上問題はありません。よく振ってお飲みください。

第3類医薬品



【効能・効果】

●滋養強壮 ●虚弱体質 ●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1瓶(100mL)を服用する。

◆15歳未満は服用しないこと。

◆定められた用法・用量を厳守すること。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

(2)小児の手の届かない所に保管すること。

(3)他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)

(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

【お客様相談室】 ☎ 06-6131-1300

(祝祭日を除く月～金曜日 10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬

大阪市北区曾根崎2丁目7番4号

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931