

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 眠け防止薬

第3類医薬品

# カーフェソフト錠<sup>®</sup>

### 特徴

カーフェソフト錠は、2錠中におよそコーヒー3杯分に相当するカフェインを含有した眠け防止薬です。成分のカフェインが精神機能を活発にして、会議中や運転中などの眠けを除去してくれます。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる]

##### 1. 次の人は服用しないでください

(1)次の症状のある人

胃酸過多

(2)次の診断を受けた人

心臓病、胃潰瘍

##### 2. コーヒーやお茶などのカフェインを含有する飲料と一緒に服用しないでください

##### 3. 短期間の服用にとどめ、連用はさけてください



#### 相談すること

##### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1)妊婦又は妊娠していると思われる人

(2)授乳中の人は

##### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談してください

服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状              |
|-------|------------------|
| 消化器   | 食欲不振、恶心・嘔吐       |
| 精神神経系 | ふるえ、めまい、不安、不眠、頭痛 |
| その他の  | どうき              |

### 効能・効果

眠けの除去

### 用法・用量

次の量を水またはお湯で服用してください。

| 年 齢       | 1 回 量   | 1 日服用量 |
|-----------|---------|--------|
| 成人（15歳以上） | 1～2錠    | 5錠まで   |
| 小児（15歳未満） | 服用しないこと |        |

(1)続けて服用する必要がある場合は、4時間以上の間隔をおいてください。

(2)かまづに早めにのみこんでください。(かむと苦味がでます。)

(3)錠剤の取り出し方

右図のように、錠剤の入っているシートの凸部を指先で強く押して、裏面の膜を破り、錠剤を取り出して服用してください。(誤ってシートのままのみこんだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



(裏面へつづく)

## ■ 成分と働き ■

1錠中に次の成分を含みます。

| 成 分     | 含 量  | 働 き                               |
|---------|------|-----------------------------------|
| 無水カフェイン | 93mg | 大脳皮質の感覚中枢を興奮させ、精神機能を活発にして眠けを除去します |

添加物として、サッカリンNa、トウモロコシデンプン、乳糖、バニリン、パレイショデンプン、D-マンニトール、香料、アセチルグリセリン脂肪酸エステル、CMC-Ca、酒石酸水素K、ジオクチルソジウムスルフォサクシネット、ステアリン酸Ca、セルロース、ポビドン、マクロゴール、リン酸水素Caを含有します。

## ■ 保管及び取扱い上の注意 ■

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
また、本容器内に他の薬剤等を入れ  
ないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。



## ■ 包装 ■

カーフェソフト錠 ..... 16錠

\*錠剤の入っているシートの材質の一部をアルミニウムに変更しました。

### 本品についてのお問い合わせ先

- お買い求めのお店
- エーザイ「お客様ホットライン室」(フリーダイヤル ☎ 0120-161-454)  
受付時間 平日 9:00~18:00(土、日、祝日 9:00~17:00)

エーザイホームページでも商品の内容を紹介しています。

<http://www.eisai.co.jp>

製造販売元



サンノーバ株式会社

群馬県太田市世良田町3038-2

発売元



エーザイ株式会社

東京都文京区小石川4-6-10

SU15785-4GT