

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要ときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面および容器ラベルに記載)
を過ぎた製品は使用しないこと

販売名: のどぬーるスプレーB

特徴

- 1) のど粘膜の細菌などを殺菌・消毒するスプレータイプの のどの殺菌・消毒薬
- 2) 長いノズルで患部に効き目がしっかり届く
- 3) 携帯しやすく必要な時に使える(携帯用袋付き)

△ 使用上の注意

☒ (してはいけないこと)

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
 - (1) 本剤または本剤の成分、ヨウ素(ポビドンヨード)によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 甲状腺疾患のある人
 - (3) 2才未満の乳幼児
 - (4) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (5) 授乳中の人

2. 長期連用しないこと

3. 大量に噴射しないこと

☒ (相談すること)

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人: 口内のひどいだれ

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状 |
|------|----------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 口 | あれ、しみる、灼熱感、刺激感 |
| 消化器 | 吐き気 |
| その他 | 不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

| 症状の名称 | 症状 |
|-------------|--|
| アナフィラキシー様症状 | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさなどがあらわれる |

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

【効能・効果】 のどの殺菌・消毒

【用法・用量】 1日数回、適量を患部に噴射してください

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら噴射すること(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがある)
- (2) 小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (4) のど用のみ使用すること
- (5) 薬液を誤って大量に飲み込んだときは、直ちに医師の診療を受けること

(裏面につづく)

【成分・分量】 100mL中

| 成分 | 分量 | はたらき |
|-----|------|----------|
| ヨウ素 | 0.5g | のどの殺菌・消毒 |

添加物として、ヨウ化K、グリセリン、プロピレングリコール、D-ソルビトール、エタノール、トメントール、香料を含有する

＜成分・分量に関連する注意＞

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯など)が変色することがある

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに、キャップをしっかりとめて立てて保管すること
 - (2) 小児の手の届かないところに保管すること
 - (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- 使用中に薬液がこぼれ衣類などが着色したら、すぐに水洗いすること
 - 液が出ないときは、液が出るまで数回空押しすること
 - 温度の低い場所で保管された場合、液が出にくいときがある。その場合は手のひらなどで温めてから使用すること





その他の注意

- 噴射するとき、ポンプの頭部はゆっくり押してください。速く押すと液がはね返って飛び散ることがありますのでご注意ください
- ノズルの先端を針などで突くと折れたとき大変危険ですので絶対におやめください

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

| | |
|---|--|
|  発売元 小林製薬株式会社 〒541-0045 大阪市中央区道修町4-410 製品のお問合せ先(お客様相談室) ☎0120-5884-01 受付時間9:00~17:00(土・日・祝日を除く) ホームページ http://www.kobayashi.co.jp | 製造販売元 小林製薬株式会社 〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3 |
| MADE IN JAPAN | 10119175 |

使用方法

| | | |
|---|---|--|
| ①ノズルが図のように見えるように持つ  | ②ノズルを手前に引き上げる  | ③ノズルを持ってキャップをはずす  |
| ④はじめて使用する時は、必ず液が出るまで4~5回空押ししてください 1回2~3噴射を目安に適量を噴射してください | | ⑤ 使用後は、キャップを確実にはめてノズルをもとの位置にもどしてください |
|  <ul style="list-style-type: none"> ● 軽く息をはきながらご使用ください 息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがあります | | |

患部にうまく薬液が届かない場合は、鏡を見ながら図Aの斜線部を目がけて噴射してください。図Bの様に大きく口を開け、やや上を向いて噴射すると、うまく患部に命中します

