

ご使用前に次の説明を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。

⚑ 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ

- (2)5~6日間使用しても症状がよくならない場合

成分・分量

膏体100g(875cm³)中
サリチル酸グリコール 1.0g I-メントール 1.0g
dl-カンフル 0.5g トコフェロール酢酸エステル 0.3g
オウバク軟エキス 0.3g (原生葉換算量 1.0g)
サンシシ軟エキス 0.167g (原生葉換算量 0.5g)
アルニカチンキ 0.5mL (原生葉換算量 0.1g)
添加物として、ゼラチン、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、尿素、エテト酸Na、カオリン、酸化チタン、pH調整剤、その他3成分を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。未使用分はもとの袋に入れ、チャックをきちんと閉めて保管してください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

効能・効果

打撲、ねんざ、筋肉痛、筋肉疲労、腰痛、関節痛、肩こり、骨折痛、しもやけ

用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1~2回貼付してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (4)皮ふの弱い人は、本剤と同じ所に続けて使用しないでください。
(使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。)

販売名：百草シップII

発売元

長野県製薬株式会社

長野県木曽郡王滝村此の島100-1

お問い合わせ先：お客様相談窓口

フリーダイヤル 0120-100-975

副作用被害救済制度

0120-149-931

製造販売元

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地