

第2類医薬品

外用皮膚疾患用薬

MEDICARE®

メティケア®シリーズ

【販売名】パンパス軟膏

この添付文書は、本剤の使用前に必ずお読みください。


なお、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

日やけ・やけどによる炎症とは…

過剰な紫外線を浴びることで、皮膚はダメージを受け、皮膚の赤み、ヒリヒリ続く痛み、水ぶくれ、炎症などの肌トラブルが引き起こされます。悪化する前に効果的な治療をしましょう。

パンパス軟膏は

パンパス軟膏は、炎症を起こした日やけ、やけどを効果的に治療します。酸化亜鉛が炎症を抑え、保護し、フェノールやイソプロピルメチルフェノールが殺菌・消毒し、化膿を防ぎ、サリチル酸が角質軟化し、ヨーカレシチンが血行を良くし、治りを早める医薬品です。刺激の少ない軟膏タイプで、患部にしっかりと塗布できます。



(イメージ図)

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 湿潤やただれのひどい人
 - (5) 深い傷やひどいやけどの人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

日やけ、やけど、きりきず、すりきず、しもやけ、ひび、あかぎれ、かぶれ、ただれ、よう、ちょう、くさ、痔

用法・用量


1日2~3回患部に塗布又は貼用してください。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 定められた用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

【チューブの穴のあけ方】

キャップを逆さまにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててください。



成分・分量

(100g中)

| 成 分 | 含量 | はたらき |
|----------------|-------|-------------------|
| 酸化亜鉛 | 6.0g | 消炎・保護のはたらきがあります。 |
| フェノール | 0.5g | 殺菌消毒作用があります。 |
| サリチル酸 | 0.1g | 角質軟化作用があります。 |
| イソプロピルメチルフェノール | 0.05g | 患部を殺菌し、化膿を防ぎます。 |
| ヨクレシチン | 0.5g | 血行を良くするはたらきがあります。 |

添加物として、コレステロール、ステアリルアルコール、サラシミツロウ、精製ラノリン、ワセリン、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店、または次のところにお問い合わせください。
森下仁丹株式会社「お客様相談室」06-6761-0003
受付時間 平日9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構 ☎0120-149-931
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

発売元 森下仁丹株式会社
大阪市中央区玉造1丁目2番40号
<http://www.jintan.co.jp>

製造 万協製薬株式会社
販売元 三重県多気郡多気町五桂1169-142