

とろ～り薬液でうるおいが持続

アイボントロ～リ目薬ドライアイ

2008年8月改訂

とろとしたさしごこち じんわり広がるうるおい感

コンタクトをしたままで

目薬

第3類医薬品

アイボン
トロ～リ目薬
ドライアイ

販売名:アイボン トロ～リ目薬 ドライアイ
(Eye Drop)

ご使用に際してこの説明書を必ずお読みください。
また必要ときに読めるよう大切に保管してください。
使用期限(パッケージ底面及び容器裏面に記載)を
過ぎた製品は使用しないこと

コンタクトで目が乾いたり、装着による不快感やゴロゴロとした異物感を感じたり……
普段しっかり涙が守っている目も、コンタクトレンズやパソコンの使いすぎなどで
目が乾いてくると、このような様々な不快症状だけでなく、ドライアイ状態により
角膜表面に傷や障害が起こる可能性もあります。
コンタクトをしたまま目のお手入れをしたい方にぴったりなのが、涙液処方
のアイボン トロ～リ目薬 ドライアイ。角膜保護成分配合のとろみのある薬液が、
涙の不足で乾きがちな角膜表面にじんわり広がって、うるおい感たっぷりに目の
乾きを癒します。

特 徴

- とろみのある薬液が乾きがちな角膜表面にじんわり広がり、
目の乾きを解消します
- コンドロイチン硫酸エステルナトリウムが、角膜をじっくり保護します
- 涙に近い成分なので、コンタクトをしたまま目のお手入れができます
※すべてのコンタクトに使えます
・コンタクトをしていない方もお使いいただけます。

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

① 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人 はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人 緑内障

② 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に
相談すること

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

- (2) 目のかすみ改善されない場合
- (3) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

涙液の補助（目のかわき）、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目の疲れ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴 点眼する

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 白く混濁したものは使用しないこと
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないこと
- (4) 点眼用にのみ使用すること

成分・分量（100mL中）

成 分	分 量	はたらき
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	500 mg	角膜保護作用
塩化カリウム	50 mg	涙液成分
塩化ナトリウム	300 mg	涙液成分
ヒプロメロース	350 mg	うるおい保持作用

添加物として、ホウ酸、エデト酸Na水和物、ソルビン酸カリウム、pH調整剤を含有する

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 他の人と共用しないこと
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

※ 保存の状態によっては、容器の口周辺に白い結晶が付着することがあるので、その場合は清潔なガーゼ等で軽くふき取って使用すること

※ 点眼後しばらく視野がぼやけることがあるので注意すること

●キャップの開閉方法

キャップ部分を上にして、容器の側面を持って開閉してください。

※ 容器の中心を押さえて開閉すると、薬液が飛び出すことがあります。

① 開け方
キャップを
手前に
ひねる



② 閉め方
カチッと
音がするまで
押し下げる



発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-3-6

製品のお問い合わせ先
お客様相談室 ☎ 06(6203)3625
受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
ホームページ <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元
東亜薬品株式会社

〒939-3542 富山県富山市水橋開発277番10

00000000

MADE IN JAPAN

04