

この外箱は本剤とともに保管し、使用の際にはよくお読みください。

ロートフラッシュ® 洗眼薬

使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。…はげしい目の痛み
 - 次の診断を受けた人。…眼球乾燥症候群(ドライアイ)
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

●その他、目に何らかの異常が感じられた場合

効能・効果

目の洗浄、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)

用法・用量

添付のアイカップで、1日3~6回、1回5mLを用いて洗眼してください。●くわしい使い方は側面をご覧ください。

用法・用量に関連する注意

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。また、再装着する場合は、洗眼してから10~15分程度あけてください。
- アイカップは使用前後に水道水で十分に洗浄してください。
- 混濁したものは使用しないでください。
- 洗眼用にのみ使用してください。(7)長期連用しないでください。

成分

グリチルリチン酸二カリウム ……………0.025%
 マレイン酸クロルフェニラミン ……………0.003%
 L-アスパラギン酸カリウム ……………0.1%
 添加物:ホウ酸、ホウ砂、l-メントール、d-カンフル、ペパーミントオイル、プロピレングリコール、エト酸Na、ポリソルベート80、pH調節剤

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- アイカップは他の人と共用しないでください。
- 使用期限(外箱・容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の口周辺につくことがあります。その場合は、清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。

使いやすさがうれしい 安心設計。



FULL PACK

不正加工防止のため、アイカップごとボトルをバッキングしています。

EYE CUP

人間工学に基づいた設計。指先の力がカップ全体にかかり液もれを防止します。

ECO BOTTLE

側面にスリットが入り、使用後に手でつぶしやすいエコボトルを採用しました。

不正加工防止包装

この製品は容器をPETフィルムで封かん包装しています。

※防腐剤(塩化ベンザルコニウム、パラベン)を配合していません。

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

使い方

目のまわりのよごれや化粧をふきとってからご使用ください。



- 本剤をアイカップに5mL(カップ内側の線まで)入れます。
- 顔を下に向けて、アイカップを片方の目に押し当ててください。
 - 指先に軽く力を入れながら目に押し当てると、アイカップがくっつきやすくなります。
 - 目じり側と鼻側を間違わないようにしてください。アイカップには「目じり」が表記してあります。
- アイカップを目に押し当てたまま、液がこぼれないように上を向き、そのまま数回まばたきをしてください。
 - あまり長い間(10秒以上)、洗眼しつづけないでください。
- 液を捨ててアイカップを洗浄してから、もう片方の目も同様に洗眼してください。
 - 片方の目を洗った本剤は、もう片方の目に使用しないでください。
- 使用後はアイカップを十分に洗浄してください。
 - アイカップに残った水分は清潔なティッシュ等でふきとるか、自然乾燥をおすすめします。

お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、また、ご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020

大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1