

# 口腔内殺菌剤

## のどの殺菌・消毒

# のどぬ〜る



口腔内殺菌消毒薬

(Throat Disinfectant)

### のどの殺菌・消毒 のどぬ〜る

殺菌・消毒効果の高い有効成分を自分で直接ぬることができます。

ご使用に際し、この説明書を必ずお読みください。また必要な時に読めるように大切に保管してください。使用期限(パッケージ側面およびビンラベルに記載)を過ぎた製薬は使用しないこと

販売名：のどぬ〜る

第3類医薬品

#### ▲ 使用上の注意

##### ☒ (してはいけないこと)

(守らぬと既存の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

① 次の人は使用しないこと

- (1) 本品またはヨウ化による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫などを起こしたことのある人
- (2) 中核性疾患のある人
- (3) 2才未満の乳幼児

② 長期連用しないこと

③ 大量に使用しないこと

##### ■ (相談すること)

① 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊娠、または妊娠していると思われる人
- (3) 授乳中の人
- (4) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 喉部が広範囲の人または口内のたぐれがひどい人

② 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師または薬剤師に相談すること

(1) 使用中または使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、吐気
その他	潮熱しき、不快感

まれに下記の重篤な症状があらわれることがあります  
その場合は直ちに医師の診察を受けること

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐじんましん、浮腫、胸苦しさなどとともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさなどがあらわれる
アナフィラキシー重症状	胸苦しさ、めまい、じんましん、発疹などがあらわれる

(2) 5〜6日間使用しても症状がよくなりません

#### 効能・効果

のどの殺菌・消毒

#### 用法・用量

噴霧、液量を喉部に塗布してください

##### <用法・用量に関連する注意>

- (1) のどにあるとき、鼻などにしみこませ過ぎないように注意すること
- (2) 実液をこぼして大量に飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること
- (3) 小児に使用される場合には常に注意し、保護者の指導監督のもとに使用すること

#### 成分・分量 (100mL中)

成分	分量	はたらき
ヨウ素	1.0g	のどの殺菌・消毒

添加物として、ヨウ化カリウム、グリセリン、ハッカ水、香料(フェノール)を含有する

##### <成分・分量に関連する注意>

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(補歯など)が変色することがある

#### 保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して立てて保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質がかかる)

● 使用中に液がこぼれ衣類などが着色したら、すぐに水洗いすること

発売元

小林製薬株式会社

〒547-0045 大阪市中央区南船場4-4-10

— 製品のお問い合わせ先 —  
お客様相談室 ☎06(6203)3625  
受付時間 9:00~17:00(土・日・祭日を除く)

ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元

福地製薬株式会社

〒629-1605 滋賀県蒲生郡日野町寺尾824



MADE IN JAPAN