

第2類医薬品



ゼリア新薬

販売名:アンミナイト 第2類医薬品

この外箱は、お薬とともに保管し、ご使用の際にはよくお読みください。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
 - (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (2) 15才未満の小児。
 - (3) 日常的に不眠の人。
 - (4) 不眠症の診断を受けた人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他の催眠鎮静薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

(眠気をもよおして事故を起こすことがある。また、本剤の服用により、翌日まで眠気が続いたり、だるさを感じる場合は、これらの症状が消えるまで、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。)
4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
5. 服用前後は飲酒しないこと
6. 寝つきが悪い時や眠りが浅い時のみの服用にとどめ、連用しないこと

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 高齢者。(高齢者では眠気が強くあらわれたり、また反対に神経が高ぶるなどの症状があらわれることがある。)
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。排尿困難
 - (5) 次の診断を受けた人。緑内障、前立腺肥大

眠りが浅い
寝つきが悪い

一時的な不眠による
このような症状の緩和

ヒツジの数が...



睡眠改善薬

アンミナイト®

ドリンクタイプ

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤, かゆみ
消化器	胃痛, 吐き気・嘔吐, 食欲不振
精神神経系	めまい, 頭痛, 起床時の頭重感, 昼間の眠気, 気分不快, 神経過敏, 一時的な意識障害(注意力の低下, ねぼけ様症状, 判断力の低下, 言動の異常等)
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難
その他	倦怠感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

口のかわき, 下痢

4. 2～3回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

その他の注意

翌日まで眠気が続いたり、だるさを感じることがある。

【**効能・効果**】 一時的な不眠の次の症状の緩和：寝つきが悪い、眠りが浅い

【**用法・用量**】 寝つきが悪い時や眠りが浅い時、次の量を1日1回就寝前に服用する。

年 齢	1回量
成人(15才以上)	1瓶(30mL)
15才未満	服用しないこと。

〈**用法・用量に関連する注意**〉

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)1回1瓶(30mL)を超えて服用すると、神経が高ぶるなど不快な症状があらわれ、逆に眠れなくなることがある。
- (3)就寝前以外は服用しないこと。

【**成 分**】 1日量(1瓶30mL)中
ジフェンヒドラミン塩酸塩50mg 添加物：エリスリトール, スクラロース, カラメル, 安息香酸Na, クエン酸Na, 香料, エタノール, バニリン, D-ソルビトール, pH調節剤2成分, その他1成分

【**保管及び取扱い上の注意**】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

品名コード 5937



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

お客様相談室 ☎ 03-3661-2080

受付 9:00～17:50(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

アンミナイトはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。