

- 服用に際して、この添付文書を必ずお読みください  
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
- 使用期限（パッケージ側面に記載）を過ぎた製品は服用しないこと

漢方製剤 第2類医薬品

販売名:コムレケア

# 足がつるこむらがえり、筋肉のけいれん

## コムレケア錠

### 特徴

- つらい足のつり（筋肉けいれん）、こむらがえりを治すお薬です
- 漢方処方「芍薬甘草湯」が、筋肉の痛み・こわばりをしっかり鎮めます
- 就寝時や外出で歩く時など、足がつった時におすすめです

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の診断を受けた人は服用しないこと：心臓病
2. 症状があるときのみでの服用にとどめ、連用しないこと



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 次の症状のある人：むくみ
- (5) 次の診断を受けた人：高血圧、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

- (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります  
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛などがあらわれる
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神などがあらわれる
肝機能障害	全身のだるさ、黄だん（皮ふや白目が黄色くなる）などがあらわれる

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

● 処方箋を必要とする場合があります。  
 ● 処方箋を必要とする場合があります。  
 ● 処方箋を必要とする場合があります。

品名 漢方薬 順健散

発売元 小林製薬株式会社

## 効能・効果

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症:こむらがり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

## 用法・用量

次の量を食前または食間に水または白湯で服用してください

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	4錠	3回
7才以上15才未満	2錠	
7才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法・用量を厳守すること
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- ※食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間後のことをいいます

## 成分・分量 1日量(12錠)中

芍薬甘草湯エキス…2.4g

<原生薬換算量>

シャクヤク…6.0g

カンゾウ…6.0g

添加物として、ステアリン酸Mg、CMC、CMC-Na、二酸化ケイ素、トウモロコシデンプンを含有する

## 保管および取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと
- (5) 1包を分割して服用する場合、残った薬剤は袋の口を折り返して保管すること。また、保管した残りの薬剤は、その日のうちに服用するか捨てること

発売元  
**小林製薬株式会社**  
 〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

— 製品のお問い合わせ先 —  
 お客様相談室 ☎ 06(6203)3625  
 受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)  
 ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元  
**小林製薬株式会社**  
 〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3