

スルーラックプラス

SURULAC PLUS

便秘で便が硬くなると、排便時に痛みを伴ったり、痔の原因になることがあります。便秘の改善には腸管のぜん動運動をたかめ、排便をうながすとともに、便を軟らかくすることも大切です。

スルーラックプラスはピサコジルやセンノサイドカルシウムの大腸刺激性成分に、硬い便を軟らかくするジオクチルソジウムスルホサクシネート(DSS)をプラス、排便時のお尻の痛みが気になる人にも効果的です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
3. 大量に服用しないでください

👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。はげしい腹痛、悪心・嘔吐
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2) 1週間位服用しても症状がよくなる場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
下痢

■ 効能・効果

- 便秘
- 便秘にともなう次の症状の緩和：痔、腹部膨満、腸内異常発酵、頭重、のぼせ、食欲不振(食欲減退)、肌あれ、吹出物

■ 用法・用量

次の1回量を1日1回、就寝前(または空腹時)に服用します。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量または減量してください。

年 齢	成人(15才以上)	15才未満
1 回 量	● ~ ● ● ● 1 ~ 3 錠	✕ 服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は腸溶錠ですので、かんだり、つぶしたりせずに、そのまま水で服用してください。また、制酸剤又は牛乳と同時に服用しないでください。
- (3) 錠剤の取り出し方
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



(PTPシートの取り出し図)


■ 成分と作用

成分	1錠中	作用
ビサコジル	5mg	大腸粘膜に作用し、腸管のぜん動運動をたかめ、排便をうながします。
センノサイドカルシウム	5mg (センノシドA及びBとして1.97mg)	生薬センナの有効成分で、大腸内の腸内細菌により代謝され、緩下作用をあらわします。
ジオクチルソジウムスルホサクシネート(DSS)	10mg	界面活性作用により、便に水分を浸透させ膨張させて硬い便を軟らかくし、排便をスムーズにします。

添加物として、CMC-Ca、無水ケイ酸、セルロース、乳糖、白糖、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート、ポビドン、マクロゴール、アラビアゴム、カオリン、炭酸Ca、カルナウバロウ、カルボキシメチルエチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、バレイショデンプン、赤色3号、青色1号を含有します。

●本剤の服用により、尿が橙色又は赤色をおびることがあります。

《トリプル処方でしっかり効く!》



■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限をすぎたものは服用しないでください。

■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
 エスエス製薬株式会社 お客様相談室
 フリーダイヤル ☎ 0120-028-193
 受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4
<http://www.ssp.co.jp/>