

服用に際して、この説明書を必ずお読みください。また必要ときに読めるよう大切に保管してください。使用期限(パッケージ側面およびパウチ裏面に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

押して開ける

漢方製剤 第2類医薬品

販売名:ボーコレン
Urination Pain Medicine

⚠ 使用上の注意

- 相談すること**
- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (4) 高齢者
 - (5) 次の症状のある人: むくみ
 - (6) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病
- 2. 服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること**
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |
- まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること
- | 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしただけで息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる |
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること: 下痢
 4. 1ヶ月くらい服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効能・効果 体力中等度のものの次の諸症: 頻尿、排尿痛、残尿感、尿のにごり

用法・用量 次の量を食前または食間に水またはお湯で服用してください

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	4錠	3回
7才以上15才未満	3錠	
5才以上7才未満	2錠	
5才未満	× 服用しないこと	

成分・分量 1日量(12錠)中 五淋散料エキス…2.55g

〈原生薬換算量〉ブクリョウ3.0g、トウキ1.5g、オウゴン1.5g、カンゾウ1.5g、シャクヤク1.0g、サンシシ1.0g、ジオウ1.5g、タクシャ1.5g、モクツウ1.5g、カッセキ1.5g、シャゼンシ1.5g

添加物として、無水ケイ酸、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、セルロースを含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

MADE IN JAPAN

大容量

医薬品

ボーコレン®

第2類医薬品

つらい
**排尿痛、
残尿感に**
炎症を抑え、菌を押し流す

特 徴

- 11種類の生薬からなる漢方処方「五淋散」です
- 膀胱や尿道などに違和感を感じる方の、排尿痛、残尿感、頻尿などのつらい症状を徐々に緩和していきます

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところにチャックをしっかりとめて保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
製品のお問合せ先(お客様相談室)
☎0120-5884-01
受付時間9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元
小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

使用期限
(西暦年/月)

有効期限



4

