

販売名：セピーハーブドリンク

〔使用上の注意〕

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

●長期連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 高齢者。
- (3) むくみのある人。
- (4) 心臓病、高血圧、腎臓病の診断を受けた人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

皮膚：発疹

消化器：胸やけ、吐き気、下痢

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6日間服用しても症状がよくなりなない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕発熱性消耗性疾患・病中病後・栄養障害・食欲不振・肉体疲労・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質

〔用法・用量〕成人（15才以上）1回1瓶（30mL）、1日2回服用する。なお、15才未満は服用しない。

●用法・用量を厳守すること。

CEP/E

発熱性消耗性疾患時などの栄養補給、滋養強壮に

セピー®ハーブドリンク



〔成分〕1日量（2瓶60mL）中
 かんぞう乾燥エキス900mg（かんぞう4500mgに相当）、コウジン乾燥エキス60mg（コウジン600mgに相当）、ショウキョウ流エキス0.5mL（ショウキョウ500mgに相当）、タウリン1000mg、ビタミンB₂リン酸エステル10mg、ビタミンB₆50mg
 添加物：白糖、カラメル、ブチルパラベン、ポビドン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、クエン酸Na、香料、バニリン、エチルバニリン、メントール、エタノール、プロピレングリコール、pH調節剤2成分（アルコール0.3mL以下）〔保管及び取り扱い上の注意〕（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管する。（2）小児の手のとどかない所に保管する。（3）本剤はまれに混濁することがあるが、薬効には変わりない。（4）使用期限を過ぎた製品は服用しない。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元
ゼリア新薬工業株式会社
 東京都中央区日本橋小舟町10-11
 お客様相談室 ☎03-3661-2080
 セピーはゼリア新薬工業（株）の登録商標です。

第2類医薬品