

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限(箱底面及びチューブ底に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

販売名:オシリア
Hemorrhoidal Ointment

外用痔疾用薬

第②類医薬品



効能・効果 きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

用法・用量 適量を取り、肛門部に塗布する。なお、1日3回まで使用できる

<用法・用量に関連する注意> (1)定められた用法・用量を厳守すること (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (3)肛門部にのみ使用すること

成分・分量 100g中

ヒドロコルチゾン酢酸エステル0.5g、ジフェンヒドラミン塩酸塩1g、リドカイン3g、イソプロピルメチルフェノール0.1g、トコフェロール酢酸エステル3g 添加物として、ワセリン、グリ化炭化水素、マイクロクリスタリンワックス、ペヘニルアルコール、サラシミツロウ、ラノリンアルコール、プロピレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、BHT、ポリソルベート80、セスキオレイン酸ソルビタンを含有する

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること (2)小児の手の届かない所に保管すること (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

△使用上の注意 **⊗してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 1.次の人は使用しないこと 患部が化膿している人 2.長期連用しないこと

📞相談すること 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

3.10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

製剤のお問合せは、
お買い求めのお店
又はお客様相談室
にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

