

# もたれ・胸やけ むかつき 胃痛に

出過ぎた胃酸をコントロールして、  
胃もたれ・胸やけなどを改善

第1類医薬品 一般用

H<sub>2</sub>ブロッカー胃腸薬

# アミノン<sup>®</sup>Z

胃腸内服液



飲みきり  
タイプ

アセロラ風味



ゼリア新薬

セルフメディケーション

税 控除 対象



## 販売名：アシノンZ胃腸内服液

H<sub>2</sub>ブロッカー胃腸薬 **一般用**

ご使用に際して、この文書をよくお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

- ・3日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を止めて、医師又は薬剤師に相談すること。
- ・2週間を超えて続けて服用しないこと。\*
- \*重篤な消化器疾患を見逃さずおそれがありますので、医師の診療を受けること。

### ⚠️ 使用上の注意

してはいけないこと **❌**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

#### 1. 次の人は服用しないこと

- (1)ニザチジン等のH<sub>2</sub>ブロッカー薬によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、のど・まぶた・口唇等のはれ)を起こしたことがある人。
- (2)医療機関で次の病気の治療や医薬品の投与を受けている人。  
血液の病気、腎臓・肝臓の病気、胃・十二指腸の病気、ぜんそく・リウマチ等の免疫系の病気、ステロイド剤、抗生物質、抗がん剤、アゾール系抗真菌剤(白血球減少、血小板減少等を起こすことがある。)(腎臓・肝臓の病気を持っている場合には、薬の排泄が遅れて作用が強くなる。)(胃・十二指腸の病気の治療を受けている人は、ニザチジンや類似の薬が処方されている可能性が高いので、重複服用に気をつける必要がある。)
- (3)医師から赤血球数が少ない(貧血)、血小板数が少ない(血が止まりにくい、血が出やすい)、白血球数が少ない等の血液異常を指摘されたことがある人。  
(本剤を服用するとさらに血球数等が減少する場合があります。)

- (4)小児(15才未満)及び高齢者(80才以上)。
- (5)妊婦又は妊娠していると思われる婦人並びに授乳婦。

#### 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の胃腸薬

相談すること **👤**

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人又は他の医薬品を服用している人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3)高齢者(65才以上)。  
(一般に高齢者は、生理機能が低下していることがある。)

#### (4)次の症状のある人。

のどの痛み、咳及び高熱(これらの症状のある人は、重篤な感染症の疑いがあり、血球数減少等の血液異常が認められることがある。服用前にこのような症状があると、本剤の服用によって症状が増悪し、また本剤の副作用に気づくのが遅れることがある。)

原因不明の体重減少、持続性の腹痛(他の病気が原因であることがある。)

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、のど・まぶた・口唇等のはれ
精神神経系	頭痛、眠気、めまい、手足・口のしびれ、混乱感

まれに本剤や他の同じ作用の薬の服用により、下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
血液障害	のどの痛み、発熱、全身のだるさ、顔やまぶたの裏が白っぽくなる、出血しやすくなる(歯茎の出血、鼻血等)、青あざができる(押しても色が消えない)等があらわれる。

#### 3. 誤って定められた用量を超えて服用してしまった場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

#### 4. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること 便秘、下痢、口のかわき、はきけ

#### 【効能・効果】胸やけ、むかつき、胃痛、もたれ

(本剤は、胃のヒスタミンH<sub>2</sub>受容体に拮抗する薬を含んでいる。)

<効能・効果に関連する注意> 効能・効果に記載以外の症状では、本剤を服用しないこと。

【用法・用量】胸やけ、むかつき、胃痛、もたれの症状があらわれた時、下記の1回の量を服用する。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上、80才未満)	1瓶(30mL)	2回まで
小児(15才未満)	服用しないこと。	
高齢者(80才以上)	服用しないこと。	

- ・服用後8時間以上たっても症状が治まらない場合は、もう1瓶(30mL)服用する。
- ・症状が治まった場合は、服用を止めること。
- ・3日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を止めて、医師又は薬剤師に相談すること。
- ・2週間を超えて続けて服用しないこと。

#### <用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守すること。
- (2)本剤を服用の際は、アルコール飲料の摂取は控えること。

【成分】1回量(1瓶30mL)中 ニザチジン75mg  
添加物:エリスリトール、還元麦芽糖水アメ、スクラロース、アセスルファムK、トレハロース、ブチルパラベン、クエン酸Na、香料、エタノール、バニリン、pH調節剤2成分

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

製造販売元  
**ゼリア新薬工業株式会社**  
東京都中央区日本橋小舟町10-11  
お客様相談室 ☎ 03-3661-2080  
受付 9:00~17:50(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

アシノンはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。

## 第1類医薬品

品名コード 3932

すてるときには、お住まいの市町村の定める区分に従ってください。