

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。眼科用薬

目のかゆみ・結膜充血に

ロートアルガード® しみない マイルド タイプ

第2類医薬品

レンズ装用中にも
使用できます。
(ハード・O₂のみ)

かゆみがつらい目に
防腐剤[※]無添加

容量10mL

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 次の症状のある人…はげしい目の痛み
 - (5) 次の診断を受けた人…縁内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

- (2) 目のかすみが改善されない場合
- (3) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合



効能・効果



- 目のかゆみ
- 結膜充血
- 眼瞼炎(まぶたのただれ)
- 目のかすみ(目やにの多いときなど)

- 眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)
- 紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)
- 目の疲れ
- ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1回1~2滴、1日3~6回点眼してください。

(3) 容器の先をまぶた、

容器の先と

まつ毛に触れさせな

いでください。

[汚染や異物混入(目

やにやホコリ等)の

原因となる]また混

濁したものは使用し

ないでください。



目やまつ毛が

ふれることの

ないように

● 用法・用量に関する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。

- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。

- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

- (5) 点眼用にのみご使用ください。

有効成分

グリチルリチン酸二カリウム
配合量 0.25%

アレルギーの原因物質の放出を抑制し、炎症を鎮めます。

クロルフェニラミンマレイン酸塩
配合量 0.03%

ヒスタミン（アレルギー原因物質）をブロックし、かゆみを抑えます。

塩酸テトラヒドロゾリン
配合量 0.01%

血管を収縮させ、充血を除去します。

ビタミンB₆
配合量 0.1%

目に栄養を補給し、新陳代謝を促進します。

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、等張化剤、l-メントール、d-カンフル、d-ボルネオール、エデト酸Na、ポリソルベート80、pH調節剤を含有します。
※防腐剤（ベンザルコニウム塩化物、パラベン）を含んでいません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4)他の人と共用しないでください。



- (5)使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとてご使用ください。
- (7)容器に他の物を入れて使用しないでください。

※目がかゆい時はまぶたをこすったり、刺激をくわえないようご注意ください。



お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)



ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

400611502