

第2類医薬品



痔の痛み・出血の緩和に

ドルマインH軟膏

ユーカリ油・ヒドロコルチゾン酢酸エステル・リドカイン配合 外用痔疾用薬

[特徴]

- 患部の炎症をおさえるヒドロコルチゾン酢酸エステル、傷の治りをたすけ組織を修復するアラントインなど7つの成分を配合した軟膏で、痔による代表的な4つの症状、痛み・出血・はれ・かゆみにすぐれた効果を発揮します。
- 酸化亜鉛、ユーカリ油を配合していますので、傷ついた患部を保護し、使用時に清涼感があります。
- 肛門外側のいぼ痔の痛みや、きれ痔(さけ痔)の出血等に効果的です。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人には使用しないでください
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 患部が化膿している人。
- 長期連用しないでください

相談すること



- 次の人には使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

- 10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[効能・効果]

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

[用法・用量]

適量をとり、肛門部に塗布してください。
なお、1日3回まで使用できます。

〈用法・用量に関する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 肛門部にのみ使用してください。
- 定められた用法・用量を厳守してください。



[チューブの穴のあけ方]



キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててあけてください。

[成 分] 100g 中

成 分	分量	はたらき
リドカイン	3g	局所の痛み・かゆみをしめます。
dl-メチルエフェドリン 塩酸塩	0.2g	血管を収縮させ、出血をおさえます。
ヒドロコルチゾン酢酸工 ステル	0.5g	炎症をおさえ、出血・はれ・かゆみをしめ ます。
イソプロピルメチル フェノール	0.1g	患部を殺菌し、傷口の悪化を防ぎます。
アラントイン	1g	傷の治りをたすけ、組織を修復します。
酸化亜鉛	4g	患部を收れん・保護します。
ユーカリ油	0.1g	患部に清涼感を与えます。

添加物：パルミチン酸イソプロピル、ステアリルアルコール、セタノール、流動パラ
フィン、白色ワセリン

[保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わること
があります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内で
あってもなるべく速やかに使用してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080

〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11

受付時間 9:00~17:50 (土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



ドルマインはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。

Self-Medication

製造販売元



ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

J11N

ドルマインH軟膏