こわばりや痛みで手指が動かしにくい方に

ユービケア 漢方

製品特徴

1. こわばりや痛みで手指が動かしにくい方のための漢方薬です
2. 漢方処方「桂枝加苓朮附湯(けいしかりょうじゅつぶとう)」が、血流が低下し、炎症が蓄積しやすい手指の関節に効きます
3. 血流を促進していくとともに、抗炎症作用と鎮痛作用により、手指がスムーズに動かせるようになります

小林製薬

第2類医薬品

まずは6日分
（15才以上）

18包
（顆粒）

こわばりや痛みで手指が動かしにくい方に

ユービケア 漢方

血流促進＋鎮痛＋抗炎症

まずは6日分
（15才以上）

18包
（顆粒）

第2類医薬品 •関節痛 •神経痛

体力虚弱で、手足が冷えてこわばり、尿量が少なく、ときに動悸、めまい、筋肉のぴくつきがある方に

小林製薬

＼あったらいいな／をカタチにする

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

製造販売元 大峰堂薬品工業株式会社
〒635-0051 奈良県大和高田市根成柿574

紙

MADE IN JAPAN 10203291

1

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

漢方製剤
販売名：ユービケア

第2類医薬品

Medicine for Finger Joints

⚠使用上の注意

相談すること **1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

（1）医師の治療を受けている人（2）妊婦又は妊娠していると思われる人（3）のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人（4）高齢者（5）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人（6）次の症状のある人：むくみ（7）次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病 **2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

関係部位	症　状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
その他	動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症　状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる

3.1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること **4.**長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 体力虚弱で、手足が冷えてこわばり、尿量が少なく、ときに動悸、めまい、筋肉のぴくつきがあるものの次の諸症：関節痛、神経痛

用法・用量 大人(15才以上)1回1包、7才以上15才未満1回2/3包、4才以上7才未満1回1/2包、2才以上4才未満1回1/3包、1日3回食前又は食間に水又はお湯で服用してください(2才未満は服用しないこと)

＜用法・用量に関連する注意＞（1）定められた用法・用量を厳守すること（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること ●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

押して開ける◀

成分・分量 1日量（3包：4.5g）中
桂枝加苓朮附湯エキス 2.4g
［ケイヒ・シャクヤク・タイソウ・ビャクジュツ・ブクリョウ各2.0g、ショウキョウ0.5g、カンゾウ1.0g、ブシ末 0.25g より抽出］添加物として、二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有する
●本剤は天然物（生薬）を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります

保管及び取扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること（2）小児の手の届かない所に保管すること（3）他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）（4）1包を分割して服用する場合、残った薬剤は袋の口を2回以上折り返して保管すること。また、保管した残りの薬剤は、その日のうちに服用するか捨てること

第2類医薬品

ユービケア 漢方

小林製薬

使用期限（西暦年.月）
製造番号

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

4 987072 053911

C619