

ご使用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要時にそなえて大切に保管してください。

第2類医薬品

乗りもの酔いの薬「クニヒロ」

旅行や遠出で乗物に酔うと思うだけで出かけるのがおっくうになり、大変つらいものになります。乗りもの酔いの薬「クニヒロ」は、乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛を予防し、お出かけを楽しく快適なものにするための製品です。また、気分が悪くなってから服用しても効き目があります。



⚠️ [使用上の注意]

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬）
2. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください。
(眠気があらわれることがあります)

相談すること 🗨️

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師または薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	排尿困難

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。

□のかわき

[成分] 1錠中

塩酸メクリジン.....25mg
添加物として、乳糖水和物、D-マンニトール、ポビドン、ステアリン酸マグネシウム、黄色5号を含有します。

[効能・効果]

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防および緩和

[用法・用量]

乗物酔いの予防には乗車船30分前に1回1錠を服用してください。

なお、必要に応じて追加服用する場合には、1回1錠を4時間以上の間隔をおき服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	1 錠	2 回 まで
15歳未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>


(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

<PTPシートの取り出し図>



[保管および取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。
- (4) 箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入し、この文書とともに箱に入れたまま保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのご相談は、お客様相談窓口までお願い致します。

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-023520

受付時間 平日9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号

皇漢堂製薬株式会社

(10.12.作成)