

4回分
(15才以上)

16錠

開け口

開け口

アルコールによる 酒残りに



食事の前に
または食間に

ガンマ
アルピタンY

販売名:アルピタンY(茵陳五苓散)

※二日酔

16錠

成分・分量 1日量(8錠)中 茵陳五苓散料エキス2.0g

タクシャ3.0g、ブクリョウ2.25g、チョレイ2.25g、ビャクジュツ2.25g、
ケイヒ1.5g、インチンコウ2.0g より抽出

添加物として、無水ケイ酸、セルロース、トウモロコシデンプン、CMC、
クロスCMC-Na、ステアリン酸Mgを含有する

効能・効果 体力中等度以上をめやすとして、のどが渴いて、
尿量が少ないものの次の諸症：

嘔吐、じんましん、二日酔、むくみ

第2類医薬品



小林製薬

製品特徴

- 飲酒翌日の酒残り(二日酔い)に効く漢方処方「茵陳五苓散」です
- アルコールの分解・代謝を促進し、酒残りを改善します
- 飲みやすい錠剤タイプです

開け口

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしめること

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください
使用期限(パウチ下部に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

開け口

第2類医薬品

← チャック
漢方製剤

販売名: アルピタンY (茵陳五苓散)

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヶ月位(嘔吐、二日酔い)に服用する場合には5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量 次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年 齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	4錠	1日2回
15才未満	×	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守すること

● 食間は「食事と食事の間」を意味し、食後約2~3時間のことをいいます

● 本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりしめて保管すること
(2) 小児の手の届かない所に保管すること
(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
(4) 本剤をぬれた手で扱わないこと

(上段)使用期限(西暦年.月)/(下段)製造番号



製品のお問合せは、お買い求めのお店
又はお客様相談室にお問い合わせください

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN
10187465

