

使用前に説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品

保湿チャック付

## 〈消炎鎮痛シップ剤〉

1枚あたり 10cm×14cm 薬体量7g

# パテックス<sup>®</sup>ラスピタシップ

パテックスラスピタシップ

## 特 徴

超薄型で衣類にからみつきにくく、しかも膏体がスミまでついているため、肌に密着してはがれにくいシップ剤です。



## 使用上の注意

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の部位には使用しないで下さい

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 本人又は家族がアレルギー体质の人
- (2) 薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

## 効能・効果

肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、打撲、捻挫、骨折痛、しもやけ

## 用法・用量

そのまま、または適当な大きさに切り、表面のフィルムをはがし、1日1~2回患部に貼付して下さい

〈用法・用量に関する注意〉

1. 用法・用量を厳守して下さい
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい

## 成分・分量(膏体100g中)

成 分	分 量	はたらき
サリチル酸グリコール	2g	炎症を抑え、痛みをやわらげます
メントール	1g	清涼感を与え、痛みをやわらげます
アルニカチンキ	1mL <small>(原生薬として0.2g相当)</small>	炎症を抑え、痛みをやわらげます

添加物: CMC-Na、ゼラチン、水酸化AI、グリセリン、pH調節剤、エデト酸Na、無水ケイ酸、酸化チタン、その他2成分

[1枚あたり(10cm×14cm) 薬体量7g]

## 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい
3. 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)
4. 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉め外気にふれないようにして保管して下さい
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい

\*本剤は生薬を配合しておりますので、色調が多少異なることがあります、効果に変わりはありません

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

電 話 03(6667)3232  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<ホームページアドレス><http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元

ニフロパッチ株式会社

埼玉県春日部市南栄町8番地1