

この説明文書は、本剤とともに保管し、
使用に際しては必ずお読みください。

第2類医薬品

しっしん・かぶれ・虫さされ・かゆみに

オイラックス[®]A

鎮痒消炎薬

オイラックスAの特徴

1. クロタミトンとジフェンヒドラミン塩酸塩は、虫さされ等のかゆみにすぐれた効果を発揮します。
2. ヒドロコルチゾン酢酸エステルによって、しっしん・かぶれ等の皮膚の炎症にすぐれた効果を発揮します。
3. グリチルレチン酸は、患部の炎症を緩和し、アラントインが新しい皮膚組織の成長を助けます。
4. イソプロピルメチルフェノールは、殺菌作用を発揮します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等または化膿している患部。
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感
 - (2) 5~6日間使用しても症状がよくなる場合

効 能

かゆみ、かぶれ、しっしん、虫さされ、じんましん、しもやけ、皮膚炎、あせも、ただれ

使用法

1日1～3回、適量を患部に塗布してください。

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

成分・分量

本剤は、白色のクリームで、1g中に次の成分を含有する。

成分	含有量	働き
クロタミトン	100mg	かゆみをおさえます。
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	2.5mg	皮膚の炎症をしずめます。
グリチルレチン酸	5mg	
ジフェンヒドラミン塩酸塩	10mg	かゆみをおさえます。
アラントイン	2mg	組織修復を助けます。
イソプロピルメチルフェノール	1mg	殺菌作用を発揮します。


添加物：グリセリン、ステアリルアルコール、ワセリン、ステアリン酸マクロゴール、香料
塗布後ほてり(熱感)を感じるがありますが、ごく短時間のうちに消失します。

<ヒドロコルチゾン酢酸エステルについて>

この成分は、副腎皮質ホルモン(ステロイド)の中で最も作用が緩和なランクに分類されています。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わる。)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記に
お願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

電話 03(6667)3232

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標