

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

非ステロイド

かゆみに速く効く 顔まわり・デコルテのかゆみ・かぶれに

<鎮痒消炎薬>

メソッド WOクリーム

第2類医薬品

<こんな症状に・こんな方に>



4種の有効成分が効く



かゆみをすばやく止める

- ・ジフェンヒドラミン
- ・クロタミトン

炎症を鎮め、
赤みやブツブツを抑える

- ・ウフェナマート

荒れた肌を修復する

- ・アラントイン

乾燥などの刺激から患部を守る「バリアベール基剤(WOクリーム)」採用

- しみない、肌にしっとりなじむクリーム
- 無着色、防腐剤(パラベンなど)無配合
- 赤ちゃんにも使えます

⚠ 使用上の注意

⊗ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないでください

- (1) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等。
- (2) 傷のあるところ。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

(必ず裏面もお読みください)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

かゆみ、かぶれ、湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

成分(1g中)

有効成分	含 量	はたらき
ジフェンヒドラミン	10mg	かゆみをすばやく止めます。
クロタミトン	20mg	
ウフェナマート	50mg	炎症を鎮め、赤みやブツブツを抑えます。
アラントイン	2mg	荒れた肌を修復します。

添加物：ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン脂肪酸エステル、スクワラン、パラフィン、マイクロクリスタリンワックス、マクロゴール、オレイルアルコール、グリセリン、ジメチルポリシロキサン、香料、pH調整剤

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (5) 金属及びプラスチック類(メガネ、時計、アクセサリ等)、木材(白木、床や家具等の塗装面等)などに付着すると変質又は変色する場合がありますので注意してください。
- (6) 使用後は必ずしっかりキャップを閉めてください。

■お問合せ先

お買い求めのお店又は下記にお問合せください

ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社

〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28