

第2類医薬品

虫さされ
かゆみに
ユトール

かゆみ止め液

- 効能・効果●
かゆみ、虫さされ
- 成分・含量●100mL中
ジフェニルドラミン塩酸塩 2.0g
ソドコイブ 0.5g
メメントール 3.0g
β-カンフル 2.0g
添加剤：クエン酸水溶液、ヒドロキシ
プロピルセルロース、エタノール、ア
ズビシリンジソドウム、ハアセチル
シムル、アンモニア

販売元
ノイジ薬品株式会社
東京都港区南青山4丁目4番10号

●お問い合わせ●
お客様相談窓口 070-231-0417

製造販売元
東邦薬品工業株式会社
東京都立川市南町1丁目1番地22号

製造
番号

使用
期限



虫さされ
かゆみに
ユトール

かゆみ止め液

ダブルのかゆみ止め成分で素早く効く!

ノンステロイド



スーッと
さわやかな
ゆりごち!

第2類医薬品

50mL

第2類医薬品

虫さされ
かゆみに
ユトール

かゆみ止め液

- 用法・用量●
1日2回、適量を患部に塗布してくだ
さい(患部をスポンジで十分清潔とな
してから塗布してください)
①用法・用量に関する注意
①心臓に疾患がある場合には医師の
指導監督のもとに使用してください。
②顔に入らないよう注意してください。
③汗、汗一、目に入った場合は、ま
ずくに水またはぬるま湯で洗って
ください。なお、症状が重い場合は
には、医師の診察を受けてくだ
さい。
④外用にのみ使用してください。
押さめられた用法・用量をお守りく
ださい。

手を汚さず
ラクラク
使える容器!



第2類
医薬品

ここから
買ってください

販売名 ユトールかゆみ止め液

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

【使用上の注意】

【禁忌すること】

- 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談して
ください
①医師の診察を受けている人。
②本人または家族がアレルギー体質の人。
③薬によりアレルギー一症状を起こしたことがある人。
④湿疹やかたれのかたれの人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書
を持って医師または薬剤師に相談してください
①使用中、次の症状があらわれた場合。

発熱部位	症 状
皮 膚	発赤・発疹、かゆみ、はれ

②1～6日経過後にも症状がよくならない場合。

●保管及び取扱い上の注意●

- 直射日光の当たらない室温の少ない涼しい所に密
封して保管してください。
- 小児の手やのどがたがいに届かないよう保管してくだ
さい。
- 他の容器に入れかえないでください。(内容物の固
固になったり品質が変わる)
- メダニ、時計、アクセサリー等の金属類、化粧の
道具、プラスチック類、歯や歯肉などの歯肉面等
に付着すると変質することがありますので、付着
しないよう注意してください。
- 大瓶に近づけないでください。
- 使用期限(有効性及び有効性に記載)を過ぎた製品は
使用しないでください。

製作用検査数済制度 電話 0320-149-031