

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。



ROHTO
Lycée
CONTACT

目薬

販売名:ロートリセコンタクトb

第3類医薬品

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる

フリーアングルノズル®

"リセ"したい時、簡単、確実にアイケアできて、
とっても便利です。



"自由な角度で点眼OK!"

キャップの開閉方法

キャップの開け方

キャップを手前に
ひねってください。



キャップの閉め方

カチッと音がするまで
押し下げてください。



※容器全体を支えるように持ち、キャップを上にして開閉してください。容器の中央部分だけを持って開閉すると、薬液がとびだしてもらえることがあります。

カラーコンタクトレンズを含む
すべての種類のコンタクトレンズに
使用できます。

ソフト

ハード

O₂

使い捨て

*コンタクトレンズ(カラーコンタクトレンズを含む)は、
眼科医による処方、定期検査を受けて使用ください。
*レンズをはずした後にも使用できます。

⚠️ 使用上の注意

相談すること



- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人…はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人…緑内障
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

- 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 目のかすみ改善されない場合
 - (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量

1回1～3滴、1日5～6回点眼してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用にのみ使用してください。
- (4) コンタクトレンズを装着していないときも使用できます。



容器の先と
目やまつ毛が
ふれることの
ないように

成分

塩化カリウム……………	0.08%	炭酸水素ナトリウム……………	0.05%
塩化ナトリウム……………	0.44%	ヒプロメロース……………	0.02%
ブドウ糖……………	0.02%	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム……………	0.5%

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、エドト酸Na、ヒアルロン酸Na、塩酸ポリヘキサニド、*l*-メントール、グラニオール、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9：00～18：00 (土、日、祝日を除く)