

使用前にこの説明書きを必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

 <p>くわしい情報は こちらから!</p> <div style="text-align: center;">  <p>https://jp.rohto.com/ pac/135653/</p> </div>	<p>販売名:ロートリセb 第2類医薬品 目薬</p> <p style="text-align: center;">⚠ 使用上の注意</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;">相談すること</td> <td colspan="2">医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。</td> </tr> <tr> <td>1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3)次の症状のある人…はげしい目の痛み(4)次の診断を受けた人…眼内障</td> <td>関係部位</td> <td>症状</td> </tr> <tr> <td>2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持つ</td> <td>皮ふ</td> <td>発疹・発赤、かゆみ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>目</td> <td>充血、かゆみ、はれ、しみて痛い</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">3. 次の場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)目のかすみが改善されない場合(2)5~6日間使用しても症状がよくならない場合</td> </tr> </table> <p>用法・用量 1回1~3滴、1日5~6回点眼する。 ●用法・用量に関する注意(1)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあるので用法・用量を厳守すること。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。(3)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないこと。[汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因となる]また、混濁したものは使用しないこと。(4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。(5)点眼用にのみ使用すること。</p> <p>効能・効果 結膜充血、目のかゆみ、目の疲れ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかすみ(目やにの多いときなど)</p> <p>成分 塩酸テトラヒドロジリン0.05%、硫酸亜鉛水和物0.1%、ビタミンB₂:0.006%、クロルフェニラミンマレイン酸塩0.01%、コンドロイチン硫酸エヌカルナトリウム0.5%、L-アスパラギン酸カリウム1% 添加物として、ホウ酸、L-メントール、d-カンフル、ベルガモット油、グリニオール、ヒプロメロース、クロロブタール、ヒアルロン酸Na、ボリソルベート80、pH調節剤を含有する。</p> <p>保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないこと。※有効成分のビタミンB₂(ピンク色)は光にあたると分解して退色する。使用後は必ずキャップを閉めて、日光や蛍光灯などに当たらないようにして保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わること)(4)他の人と共用しないこと。(5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、保管及び取扱い上の注意に従い、1~2ヶ月を目安に使用すること。(6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがある。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとて使用すること。(7)容器に他の物を入れて使用しないこと。</p> <p>お問い合わせ先: お客様サポートデスク 東京: 03-5442-6020 大阪: 06-6758-1230 受付時間 9:00~18:00 (土、日、祝日を除く)</p> <p style="text-align: right;">ROHTO ロート製薬株式会社 大阪市生野区巽西1-8-1</p>	相談すること	医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。		1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3)次の症状のある人…はげしい目の痛み(4)次の診断を受けた人…眼内障	関係部位	症状	2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持つ	皮ふ	発疹・発赤、かゆみ		目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い		3. 次の場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)目のかすみが改善されない場合(2)5~6日間使用しても症状がよくならない場合		<p>← 使用前にこの箱内側の説明書きを必ず お読みください。また、必要な時に 読めるよう保管してください。</p> <p>←</p>
相談すること	医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。																
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3)次の症状のある人…はげしい目の痛み(4)次の診断を受けた人…眼内障	関係部位	症状															
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持つ	皮ふ	発疹・発赤、かゆみ															
	目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い															
	3. 次の場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)目のかすみが改善されない場合(2)5~6日間使用しても症状がよくならない場合																