

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

スマイル40メディクリア

眼科用薬

第2類医薬品

●スマイル40メディクリアの特徴

抗炎症酵素 リゾチーム塩酸塩 最大濃度※配合

※一般眼科用薬製造販売承認基準の最大濃度配合

「リゾチーム」は、涙に含まれている成分で、抗炎症・溶菌作用などの薬理作用を有しており、大切な瞳を守っています。

しかし、年齢などによりリゾチームが減少していくと、目のトラブルが起きやすい環境になりがちです。

スマイル40メディクリアは、涙の働きを助ける抗炎症酵素「リゾチーム塩酸塩」に加え、かゆみを抑える「クロルフェニラミンマレイン酸塩」、充血を除去する「塩酸テトラヒドロゾリン」を配合。

年齢などによる「かゆみ」「充血」が気になる方、「眼病予防」におすすめの高機能眼科用薬です。

年齢などによる かゆみ・充血・眼病予防に

〈作用〉



- ・炎症鎮静
- ・かゆみを抑える
- ・充血除去



- ・涙の安定化
- ・血行促進
- ・新陳代謝促進

- ① リゾチーム塩酸塩
- ② クロルフェニラミンマレイン酸塩
- ③ 塩酸テトラヒドロゾリン
- ④ ビタミンA
- ⑤ ビタミンE
- ⑥ ビタミンB6

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の症状のある人。はげしい目の痛み
(4) 次の診断を受けた人。緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

必ず裏面もお読みください

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

●効能

目のかゆみ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

●用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴を点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください(汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因になります。)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先を下に向けて点眼

●成分(100mL中)

有効成分	含量	はたらき
リゾチーム塩酸塩 (抗炎症酵素)	0.5g(力価)	目のかゆみ、充血、はれなどの炎症を鎮めます。 溶菌作用により細菌などから大切な瞳を守ります。
クロルフェニラミンマレイン酸塩 (抗ヒスタミン成分)	0.03g	目のかゆみなどの不快な症状を抑えます。
塩酸テトラヒドロゾリン (充血除去成分)	0.02g	目の充血を抑えます。
レチノールパルミチン酸エステル (ビタミンA)	10,000単位	角膜に直接働き、目の機能を活性化するビタミンです。
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	0.05g	血行を促進して、栄養を目に補給するビタミンです。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	0.08g	新陳代謝を促す作用があるビタミンです。

※添加物として、ホウ酸、ホウ砂、エドト酸Na、BHT、塩化ベンザルコニウム、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、プロピレングリコール、l-メントール、dl-カンフル、d-ボルネオール、ユーカリ油、等張化剤、pH調整剤を含む。

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 容器を横にして点眼したり、保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。

—お問合せ先—

お買い求めのお店又は下記にお問合せください

ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

1CA 1014